



Рис. 2. *Tetramorium bursakovi*, sp. n.: а-в - самка, голотип; г, д - самец; е - рабочий, паратипы (а - голова спереди; б - грудь и стебелек сверху; в - грудь и стебелек в профиль; г, д - стебелек в профиль; е - то же сверху)

Членики стебелька расширены слабее, чем у видов группы *T. ferox*, но сильнее, чем у представителей других групп (ИП-2,0-2,75, ИПП-1,49-1,58). Чешуйка петиоля с короткой наклонной вешиной площадкой, ее передний край сбоку немного приострен, с неглубокой выемкой посередине.

На лбу, затылочном крае головы, наличнике и внизу головы имеются многочисленные отстоящие волоски. Скутум и скутеллюм с многочисленными отстоящими волосками; членики стебелька с длинными, направленными назад отстоящими волосками. Прилежащее опушение брюшка редкое, расстояние между волосками примерно равно их длине; отстоящие волоски имеются на всей поверхности тергитов и стернитов.

Цвет темно-бурый, ноги и усики светлее.

Размеры: ДГ-0,82-0,87 (0,84), ШГ-0,88-0,91 (0,88), ДС-0,6-0,64 (0,62), ДМ-1,47-1,6 (1,53) мм.

С а м ц ы (рис. 2, г, д).

Голова субквадратная (ИГ-2,19-2,2), глаза крупные (ИГл-2,15-2,34). Лоб с явственными негрубыми морщинками, сходящимися к глазкам, в центре с продольной, более или менее гладкой полосой; между глазками и глазами морщинки частично заменены продольными рядами точек. Немногочисленные длинные отстоящие волоски могут быть на наличнике, лбу и задних углах; снизу головы несколько коротких волосков.

Грудь полностью покрыта многочисленными тонкими морщинками; сглаженная скульптура может быть на мезоплеврах и в виде узкой полосы между нотаулями; проподеум без зубчиков, самое большее - с тупыми буграми. Отстоящее опушение варьирует, но всегда есть по крайней мере несколько длинных волосков на скутуме и скутеллюме.

Членики стебелька расширены относительно слабо (ИП-1,58-1,91, ИПП-1,12-1,27). Петиоль не уплощен, в профиль с короткой вершинной площадкой. Члени-