

- морщинистая скульптура преобладает между глазами и лобными валиками (рис. 3, д). Мезоплевры со сглаженной морщинистостью и развитой шагреневой скульптурой. Шипы пропodeума короче *T. striativentre* Maug.
- 5(4) Рабочие: лоб с многочисленными густыми негрубыми морщинками (рис. 3, е). Пропodeум с длинными шипиками (рис. 3, ж). Узелок петиоля сверху слегка удлинённый. Самки: лоб с негрубыми продольными морщинками, между глазами и лобными валиками преобладает шагреневая скульптура (рис. 3, з). Мезоплевры с продольной морщинистостью Шипы пропodeума длиннее *T. schneideri* Emery
- 6(1) I тергит брюшка гладкий и блестящий, либо с поверхностной изометрической сетчатой скульптурой, либо с короткими грубыми морщинками у основания (рис. 4, а).
- 7(8) Передняя часть головы рабочих и самок морщинистая, задняя — с явственной шагреневой скульптурой (рис. 3, и). Скutum самок хотя бы в передней трети гладкий и блестящий. Тело черное или буровато-черное *T. reticuligerum* Bursakov
- 8(7) Голова рабочих либо полностью морщинистая, либо гладкая; если задняя часть головы самок с шагреневой скульптурой, то тело буровато-желтое.
- 9(10) Брюшко самок и рабочих с короткими грубыми продольными морщинками у основания (у части рабочих морщинки могут быть несколько сглажены) (рис. 4, а). У рабочих верх груди и узелки стебелька морщинистые *T. karakalense* Dlus. et Zabelin
- 10(9) Брюшко рабочих и самок без морщинок у основания.
- 11(32) Членики стебелька самок не расширенные, петиоль явственно уже постпетиоля (рис. 4, в, д; 5, а) (*ИПП* не менее 1,8; *ИПП* рабочих 2,35–2,9, у *T. caespitum* — 2,28–2,7).
- 12(13) Грудь самок высокая, в профиль слегка выпуклая, скutum нависает над пронотумом и полностью прикрывает его сверху (рис. 4, б, в). Голова рабочих с явственной продольной морщинистостью, по бокам груди преобладает гранулированная скульптура, узелки члеников стебелька сверху гладкие и блестящие *T. caespitum* (L.)³.
- 13(12) Грудь самок невысокая, скutum не прикрывает сверху передних углов пронотума (рис. 4, д, е)
- 14(15) Грудь самок в профиль слегка выпуклая, *ИМ*-1,6–1,8 (рис. 4, з). Скutum, по крайней мере в передней половине, гладкий и блестящий. Крупнее: *ДМ* больше 2 мм. Голова рабочих морщинистая, членики стебелька гладкие и блестящие, иногда с негрубой поверхностной скульптурой. Цвет рабочих и самок от темно-бурого до черного . . . *T. jacoti* Wheeler
- 15(14) Грудь самок плоская, *ИМ* больше 2,1 (рис. 5, б, г); мельче: *ДМ* не более 1,9 мм, если больше, то грудь сверху полностью гладкая, блестящая и цвет оранжевый. Голова и грудь рабочих либо скульптурированные, либо гладкие.
- 16(17) Грудь самок сверху гладкая и блестящая, *ДМ*-2,0–2,1 мм. Рабочие мелкие, голова с сильно сглаженными поверхностными морщинками, блестящая; глаза средних размеров, *ИГл*-5,3–5,7; грудь в профиль у большинства рабочих с явственным мезопропodeальным вдавлением *T. yernicosus* sp. n.
- 17(16) Грудь самок сверху большей частью или полностью с явственными продольными морщинками. *ДМ* не более 1,9 мм. Если рабочие желтые и со сглаженной скульптурой головы, то глаза мельче (*ИГл*-6,0–8,6) и мезопропodeальное вдавление не выражено.

³ Для Крыма и Уральской обл. (Насонов, 1889; Рузский, 1905) был указан *T. meridionale* Emery. Рабочие этого вида отличаются от *T. caespitum* наличием поперечных морщинок на затылке.