



Рис. 5. Детали строения *T. armatum* (а-в), *T. inerme* (с, д), *T. kisilkumense* (паратип) (е), *T. nitidissimum* (синтипы) (ж-и), *T. concaviceps* (паратип) (к) (а - грудь самки сверху; б, з, ж - грудь и стебелек самок в профиль; в, с, е, и - грудь и стебелек рабочих в профиль; з, к - голова рабочих спереди)

- 18(19) Грудь самок сверху полностью покрыта грубыми продольными морщинками, шипы проподоума острые, часто палочковидные (рис.4, д); на боках груди резкие морщинки, шагреневая скульптура не развита. Крупнее: ДМ-1,7-1,9 мм. Голова и грудь рабочих, включая мезоплевры, с грубыми продольными морщинками; узелки члеников стебелька сверху морщинистые. Самки и рабочие черные, иногда голова и грудь рабочих красновато-бурые ..... *T. forte* For.
- 19(18) Грудь самок сверху с негрубыми морщинками, скутеллюм и передняя часть скутума хотя бы частично гладкие и блестящие (рис. 5, а); на боках груди, помимо морщинистой, развита шагреневая скульптура. Голова рабочих морщинистая или гладкая, узелки члеников стебелька сверху по крайней мере частью гладкие и блестящие.
- 20(21) Самки крупнее, со слабо уплощенной грудью (ДМ-1,45-1,55 мм, ИМ-2,15-2,2), темно-бурые. Голова и верх груди рабочих с резкими продольными морщинками, на боках груди, наряду с продольной морщинистостью, имеется бугорчатая скульптура; узелки петиоля сверху