

- частью скульптурированы; тело темно-бурое до черного . . . . . *T. turcomanicum* Emery
- 21(20) Самки мельче (*ДМ*-1,25–1,4 мм), если крупнее, то тело коричневато-желтое. Голова рабочих гладкая, иногда с поверхностной штриховатой морщинистостью; если морщинистая, то морщинки тонкие, густые, узелки члеников стебелька сверху полностью гладкие и цвет тела буровато-желтый.
- 22(23) Самки мелкие (*ДМ*-1,25–1,3 мм), с умеренно уплощенной грудью (*ИМ*-2,19–2,27); щеки, виски и пространство между висками и лобными валиками с нерезкими, но явственными продольными морщинками. Голова рабочих с густыми продольными морщинками, грудь сверху морщинистая . . . . . *T. semilaeve* E. Andre
- 23(22) Самки: набор признаков иной. Голова рабочих гладкая и блестящая, иногда лоб с очень нежными поверхностными морщинками, но грудь сверху гладкая или слабо пунктированная.
- 24(27) Грудь самок слабо уплощена (*ИМ*-2,0–2,2) (рис. 5, б, г); рабочие бурые или желтовато-коричневые, с крупными глазами (*ИГЛ*-4,7–5,5).
- 25(26) Пропедеум самок без явственных зубцов, в профиль угловатый (рис. 5, г); пропедеум рабочих с очень короткими зубчиками или без них (рис. 5, д) . . . . . *T. inerme* Maug
- 26(26) Пропедеум самок и рабочих с явственными острыми зубцами (рис. 5, б, в) . . . . . *T. armatum* Emery
- 27(24) Грудь самок сильно уплощена (*ИМ*-2,3–2,6) (рис. 5, ж) (самка *T. kisilkumense* неизвестна); рабочие желтые или красновато-желтые, глаза мельче (*ИГЛ*-6,0–8,6).
- 28(29) Глаза рабочих крупнее (*ИГЛ*-6,0–6,3); узелок петиоля в профиль закругленный, без явственной вершинной площадки (рис. 5, е) . . . *E. kisilkumense* Dlussky
- 29(28) Глаза рабочих мельче (*ИГЛ*-6,7–8,6); узелок петиоля в профиль с явственной вершинной площадкой (рис. 5, и).
- 30(31) Крупнее: *ДМ* самок 1,47–1,55 мм, *ДМ* рабочих 0,9–1,0 мм. Голова рабочих с явственно вогнутым затылочным краем, глаза крупнее (*ИГЛ*-6,7–7,0) (рис. 5, к) . . . . . *T. concaviceps* Bursakov
- 31(30) Мельче: *ДМ* самок 1,3–1,4 мм, *ДМ* рабочих 0,7–0,8 мм. Голова рабочих с прямым или чуть вогнутым затылочным краем, глаза мельче (*ИГЛ*-7,0–8,6) (рис. 5, з) . . . . . *T. nitidisimum* Emery
- 32(11) Членики стебелька самок сильно расширены, петиоль немного уже постпетиоля; *ИПП*-1,1–1,4 (рис. 6, г, д) (у *T. bursakovi* *ИПП*-1,5–1,6), *ИПП* рабочих 2,0–2,32, если больше, то голова гладкая и блестящая.
- 33(44) Самки.
- 34(35) I тергит брюшка с густым прилежащим опушением, длина волосков в несколько раз больше расстояния между ними (рис. 6, а) . . . . . *T. densopilosus* Rad. et Arakel.
- 35(34) Расстояние между прилежащими волосками на I тергите брюшка примерно равно их длине или больше (рис. 6, б).
- 36(39) Скутум и голова гладкие и блестящие, иногда лоб с слабыми поверхностными морщинками (рис. 6, в). Тело красно-коричневое.
- 37(38) Постпетиоль шире; *ИПП*-1,04–1,17 . . . . . *T. ferox* Ruzsky
- 38(37) Постпетиоль уже; *ИПП*-1,27–1,36 . . . . . *T. aegae* Var. Urb.
- 39(36) Скутум и голова с многочисленными резкими продольными морщинками (рис. 6, г, д).
- 40(41) Членики стебелька слабее расширены; *ИПП*-1,5–1,6 (рис. 6, ж) . . . *T. bursakovi* sp. n.
- 41(40) Членики стебелька шире; *ИПП*-1,1–1,2 (рис. 6, з).