



Рис. 6. Детали строения *T. densopilosus* (голотип) (а), *T. aegea* (синтип *T. levigata* Karaw) (б-в), *T. confinis* (голотип) (г-е), *T. bursakovi* (паратип) (ж), *T. perspicax* (паратип *T. feroxoides* Dlus. et Zabelin) (з) (а, б - часть тергита брюшка самок; в, д - голова самок спереди; г - грудь самки сверху; е, з - грудь и стебелек самок в профиль; ж - стебелек самки сверху)

- 42(43) Скутум с многочисленными отстоящими волосками. Крупнее: ДМ-1,9-2,0 мм ..... *T. confinis* Rad. et Arakelian
- 43(42) Скутум голый или с единичными отстоящими волосками (рис. 6, з). Мельче: ДМ-1,5-1,6 мм ..... *T. perspicax* Sant.
- 44(33) Рабочие.
- 45(46) Голова и грудь сверху гладкая и блестящая, самое большее в нижней части головы могут быть слабые поверхностные штриховатые морщинки, пронотум гладкий ..... *T. aegea* Varoni Urbani<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Сходен с *T. inerte*, отличается мелкими глазами (ИГл-5,8-6,5) и более светлой окраской.