

(1944) считал *T. forte* синонимом *T. caespitum*. Неясно также, какой вид под названием *forte* имеют в виду Agosti и Collingwood (1987) из Балкан, скорее всего, *T. caespitum*. В итоге этот-обычный в южной Палеарктике вид был описан по крайней мере еще дважды: Кратохвилем (*T. moravicum* Kratochvil, 1944) и Арнольди (*T. taurocausicum* K. Arn., 1968).

В 1909 г. Эмери описал из Джиларика (Туркмения) по единственному рабочему *T. caespitum* var. *turcomanica*. В дальнейшем (Тарбинский, 1976); Длусский, 1981) определяли среднеазиатских и южноказахстанских *Tetramorium* с грубо скульппированными рабочими как *T. turcomanicum*. Позднее Длусский и Забелин (1985) описали из Копетдага *T. feroxoides* (= *T. perspica* Santschi, см. ниже), рабочие которого сходны с *T. forte* и *T. turcomanicum*, но относящегося к группе *T. ferox*. Длусский и др. (1990) полагали, что *T. turcomanicum* является младшим синонимом *T. forte*. В результате тщательного изучения обширного материала я пришел к выводу, что *T. forte* и *T. turcomanicum* — различные, хотя и близкие, виды, ареалы которых частично перекрываются (отличия см. в определительной таблице).

Распространен в Южной и частью — Центральной Европе, в Крыму, на Кавказе, в степях европейской части СССР (на север до Белгорода) и Казахстана; в горах юго-восточного Казахстана и Киргизстана (на юг до Зеравшанского и Алайского хребтов).

Tetramorium turcomanicum Emery, 1909

turcomanica Emery, 1909:702 (*T. caespitum* var., ♀, Джиларик, Туркмения); 1921:276.
turcomanicum Emery (part.): Тарбинский, 1976:109 (*Tetramorium*, ♀♂); Длусский, 1981 (биология).
forte Forel (part.): Длусский и др., 1990:202–203, nec. Forel, 1904 et auct.
sulcinode Santschi, 1927:53 [*T. caespitum* var., ♀, Семиречье, Сокулюк, западнее Пишпека (ныне Бишкек, Киргизстан), типы в NHM, Basel], syn.n.

Вопрос о разделении этого вида и *T. forte* рассмотрен выше. Я не видел типов var. *sulcinode*, но изучал описания и рисунки, сделанные Б. Писарским, и без сомнения полагаю, что этот вариант является синонимом *T. turcomanicum*.

Распространен в Закавказье, Казахстане к югу от оз. Балхаш, в горах Средней Азии, включая Копетдаг, в Иране и Афганистане.

Tetramorium striativentre Mayr, 1877

striativentre Mayr, 1877:16 (part.) (*T. caespitum* var., ♀, Самарканд, Улус, типы в ЗМ МГУ); 1880:36; Andre, 1882:286, 288; Рузский, 1905:538–539 (*T. caespitum* subsp., ♀♀); *ibidem*, p. 766–767 (*Tetramorium*); Emery, 1909:706; 1921:278; Pisarski, 1967:403; Длусский, Забелин, 1985:232, Длусский и др., 1990:208.

Четкий, слабо изменчивый вид; Распространен в горах Средней Азии и Афганистане.

Tetramorium schneideri Emery, 1898

schneideri Emery, 1898:22 (*Tetramorium*, ♀, Бухара); Рузский, 1902:2; 1905:517–519; *ibidem*, p. 767 (*T. striativentre* subsp., ♀); Emery, 1909:706; Karawajew, 1910:55; Emery, 1921:278; Pisarski, 1967:403; Тарбинский, 1976:115; Длусский, Забелин, 1985:232 (*Tetramorium*); Длусский и др., 1990:207.
striativentre Mayr, 1877:16 (part.) (*T. caespitum* var., ♀, экземпляр из Кызылкумов, материал в ЗМ МГУ).
longispina Karawajew, 1912:585 (*T. caespitum* subsp. *striativentre* var., ♀, Репетек, типы в ИЗ АН Украины; syn. Длусский и др., 1990:207.

Среди экземпляров из коллекции Федченко, описанных Майром как *T. caespitum* var. *striativentre*, часть особей относится к другому виду. Он был позднее