

описан Эмери (Emery, 1898) как *T. schneideri*. Впоследствии некоторые авторы (Рузский, 1905, с. 767; Emery, 1909; Karawajew, 1910; Pisarski, 1967; Тарбинский, 1976) рассматривали *T. schneideri* как подвид или вариант *T. striativentre*. Длусский и др. (1990) показали, что *T. schneideri* является самостоятельным видом: в ряде мест оба вида обитают совместно и не образуют переходов; var. *longispina* — аберрантные экземпляры *T. schneideri* (типы изучены).

Распространен в пустынях и низкогорных областях Средней Азии и Афганистана.

### *Tetramorium kabulisticum* Pisarski, 1967, stat. n.

*kabulisticum* Pisarski, 1967a: 403–406, fig. 62–72 (*T. striativentre* subsp., ♀♂, Afganistan, Cheikhabad, Kabul); Pisarski, 1969c: 319.

Вид был известен из Афганистана. Указывается для СНГ впервые: Туркмения, Ай-Дере (М. Нестеров).

### *Tetramorium inerme* Mayr, 1877

*inermis* Mayr, 1877: 17 (*T. caespitum* var., ♀, Самарканд, Кызылкум, типы в ЗМ МГУ).  
*inermis* Mayr: E. Andre, 1881: 287; Рузский, 1905: 539–541 (*T. caespitum* subsp.); Emery, 1909–705; Karawajew, 1910–51; Emery, 1921: 277; 1925: 191; Pisarski, 1969a: 304 (*Tetramorium*, ♀); Тарбинский, 1976: 114; Длусский, 1981 (биология); Длусский, Забелин, 1985: 232; Длусский и др., 1990: 203.  
*semilaeve* E. Andre: Длусский, Забелин, 1985: 232 (нес. E. Andre, 1881), syn. Длусский и др., 1990.  
*picta* Karawajew, 1912: 584–585 (*T. caespitum* var., ♀♀, Закаспий, Теджен, типы № 1856 в ИЗ АН Украины), syn. n.  
*plana* Karawajew, 1926: 109–110, fig. 5 (*T. caespitum* var., ♀♂♂, Ашхабад, типы № 1857 в ИЗ АН Украины), syn. n. *reticuliventre* Ruzsky, 1902: 14 (*T. caespitum* var., ♀, окрестности Аральского моря, Казалинск, тип утерян); 1905: 535; Emery, 1909: 705; 1921: 277, syn. n.

Настоящий вид характеризуется сглаженной скульптурой головы и верха груди, а также короткими шипиками проподоума рабочих. Довольно изменчив. Var. *plana* Karaw. является несомненным *inermis*; var. *picta* Karaw. представляют собой уклоняющиеся формы *inermis* с заметной тонкой морщинистостью головы рабочих, но от видов групп *semilaeve* отличаются отсутствием морщинистости на мезонотуме; подобные морщинистые экземпляры обнаружены в различных частях ареала *inermis*, часть из них была ошибочно определена из Копетдага как *semilaeve* (Длусский, Забелин, 1985). Типы var. *reticuliventre* Ruzs. утеряны. По описанию *reticuliventre* отличается от *inermis* в первую очередь наличием тонкой поверхностной сетчатой скульптуры на брюшке рабочих. Изучение многочисленного материала как из типового местонахождения, так и из других районов Средней Азии и Казахстана показало, что существуют самые разнообразные переходы между *reticuliventre* и *inermis* в скульптуре, форме тела, окраске рабочих и самок, в том числе и из одного гнезда. На сходство *reticuliventre* с *inermis* указывал еще Рузский (1905).

Один из наиболее обычных видов муравьев Средней Азии и Южного Казахстана; найден в Афганистане, Иране. Населяет ксерофитные станции на равнинах и склонах гор до высоты 1000–1200 м над ур.м.

### *Tetramorium armatum* Emery, 1925

*armata* Emery, 1925: 191 (*T. caespitum inermis* var., ♀♀, Закаспий, Аннау, типы в ИЗ АН Украины; Pisarski, 1967: 402 (*T. inermis* subsp.); 1967a: 49.  
*armatum* Emery: Santschi, 1927: 57 (*T. inermis* st., ♀); Длусский, 1962: 179 (*T. inermis* subsp.); Pisarski, 1969b: 319; Длусский, Забелин, 1985: 232 (*Tetramorium*); Длусский и др., 1990: 200.  
*brevinodis* Karawajew, 1926: 109 (*T. caespitum* var., ♀♂♂, Джизак, Самаркандская губ., типы № 4655 в ИЗ АН Украины), syn. n. *annauensis* Karawajew, 1931: 315–316 (*T. caespitum* subsp.,