

Аннау близ Ашхабада, типы № 1804 в ИЗ АН Украины), syn.n.  
*ligatum* Santschi, 1927: 57–58 (*T. inerme* st. *armatum* var., NHM, Basel), syn.n.  
*laevigatum* Karaw.: Santschi, 1927: 57 (*T. inerme* st. *armatum* var.), nec. Karawajew, 1926a.

Вид, близкий к *T. inerme*, отличается главным образом формой шипиков на проподоуме. Subsp. *annauensis* Karaw. описан по экземплярам из того же самого гнезда, что и var. *armata* Emery (N 1804 колл. Караваева), т.е. является полным синонимом var. *armata*; изучение типов var. *brevipodis* Karaw. показало их идентичность с *armatum*. Типы var. *ligatum* Sant. я не исследовал, но изучил их рисунки и описания, сделанные Б. Писарским; учитывая это и описание Сани, считаю var. *ligatum* синонимом *T. armatum*. Отнесение var. *levigata* Karaw. к *armata* Em. (Santschi, 1927) явно ошибочно: *levigata* Karaw. относится к группе *T. ferox*.

В отличие от широко распространенного в равнинных районах Средней Азии *T. inerme*, *T. armatum* приурочен к горам Средней Азии, Афганистана, Монголии и Закавказья.

#### *Tetramorium nitidissimum* Emery, 1925

*nitidissima* Emery, 1925:190 (*T. caespitum punicum* var., ♀♀, Фирюза возле Ашхабада, N 1720, 4666, nom.n. pro *lucidula*: Karawajew, 1910, типы в ИЗ АН Украины);  
*nitidissimum* Em.: Pisarski, 1967:402–403 (*T. punicum* subsp.); Длусский, Забелин, 1985:232; Длусский и др., 1990:206, рис. 51г, 52в (*Tetramorium*).  
*lucidula* Emery: Karawajew, 1910:53, nec. Emery, 1909.

Основываясь на очень кратком описании var. *lucidula* Emery, Караваев (1910) привел детальное описание рабочих и самок из Фирюзы под тем же названием. Позднее Emery (1925), изучив материалы В.А. Караваева, установил, что из Фирюзы была описана другая форма и предложил для нее новое название — var. *nitidissima*; *T. punicum* относится к группе *T. semilaeve* и весьма далек от *T. nitidissimum*, у которых гладкие голова и верх груди рабочих, а также очень маленькие глаза.

Распространен на юге Средней Азии и в Афганистане.

#### *Tetramorium concaviceps* Bursakov, 1984

*concaviceps* Bursakov, 1984. fig. 11. (*Tetramorium*, ♀♀♂, Юго-Восточный Казахстан, среднее течение р. Или, между г. Чулак и Капчагайским водохранилищем, типы в ЗМ МГУ).

Вид известен из типового местонахождения. Близок к *T. nitidissimum* и *T. kisilkumense*.

#### *Tetramorium kisilkumense* Dlussky, 1990

*kisilkumense* Dlussky: Длусский и др., 1990:205–206, рис. 53 (*Tetramorium*, ♀, Кульджуктау, Кызылкумы; Кызылкумы, Узун-Кудук, типы в ЗМ МГУ).

Известен из типовых местонахождений. Гнезда в песчаной пустыне, под кустами саксаула и древовидных солянок.

#### *Tetramorium reticuligerum* Bursakov, 1984

*reticuligerum* Bursakov, 1984: 400–402, fig. 1. (*Tetramorium*, ♀♀♂, Юго-Восточный Казахстан, среднее течение р. Или, урочище Капчагай, типы в ЗМ МГУ); Длусский и др. 1990:206–207, рис. 51а.

Довольно своеобразный вид, стоящий несколько особняком среди других *Tetramorium* Палеарктики. Известен из Южного Казахстана и гор Средней Азии, отличается скульптурой головы и строением основания скапуса.