

статусе. Не исключено, что эти описания относятся к одному и тому же виду и за ним следует оставить название, предложенное Форелем.

Ареал: Закавказье, Копетдаг.

Tetramorium perspicax Santschi, 1921

perspicax Santschi, 1921:111–112, fig. 1 (*T. caespitum ferox* var., ♀♀, Ангора, типы рабочих из ИЗ АН Украины); Emery, 1925:178; Kratochvíl, 1944:73.

feroxoides Dlussky et Zabelin, 1985:230–231, fig. 7 (*Tetramorium*, ♀♀, Западный Копетдаг, Туркмения, типы в ЗМ МГУ); Длусский и др., 1990:202, syn.n.

ferox Ruzs.: Agosti, Collingwood, 1987:277, nec. Ruzsky, 1903 (provisional).

Этот малоазиатско-центральноазиатский вид выделяется среди представителей группы *ferox* грубо скульптурированными рабочими, похожими на рабочих *T. forte* For. Сравнение типов рабочих *T. perspicax* и *T. feroxoides* показало их идентичность. Подробное описание Санчи самок и выделение им тех же отличительных признаков, что и Длусским и Забелиным, так же не оставляет сомнений в указанной синонимии.

Не исключено, что *ferox* sensu Agosti et Collingwood, 1987 также может являться *perspicax*.

Распространен в Малой Азии, Закавказье (Армения), Копетдаге.

Tetramorium densopilosus Radtschenko et Arakelian, 1990

densopilosus Radtschenko et Arakelian, 1990:372–374, fig. 1, 2e (*Tetramorium*, ♀♀♂, Армения, Хосровский заповедник; Абхазия, Очамчира, типы ИЗ АН Украины и ИЗ АН Армении).

Настоящий вид, найденный в Закавказье, отличается от видов группы *T. ferox* густым прилежащим опушением брюшка самок и скульптурой рабочих.

Известен из типовых местонахождений. Гнезда (Хосровский заповедник, в земляной кочке в пойме реки на высоте 1350 м над ур.м.) В момент сбора (14.VI 1986) в гнезде были куколки крылатых, из которых половые особи вышли в лабораторных условиях 2.VII 1986.

Tetramorium confinis Radtschenko et Arakelian, 1990

confinis Radtschenko et Arakelian, 1990:374–375, fig. 2, а–д (*Tetramorium*, ♀♀♂, Армения, Хосровский заповедник, Раздан, Арзакан; окрестности пос. Талин; Крым, Чатыр-Даг, верхнее плато; Крым, Кош-Кая; Терек, Старогладковка, типы в ИЗ АН Украины, ЗМ МГУ, ИЗ АН Армении).

НЕЯСНЫЕ МОМЕНТЫ

Из всех видов и вариантов *Tetramorium*, указанных к настоящему времени для территории СНГ, пять остались для меня неясными, поскольку коллекционные материалы, по которым они приведены, обнаружить не удалось.

1. *T. caespitum* var. *punicum* (F.Sm.); Рузский, 1905:536, ♀♀ Астраханская губ., г. Бол. Богдо; Уральская обл., Индерские горы; окрестности Гурьева.

Как видим, все находки относятся к территории сухих степей северного Прикаспия. Исходя из описания Рузского (1905) ("... голова с мелкими продольными штриховатыми морщинками; грудь почти гладкая и блестящая, только на основной поверхности заднеспинки точчатая морщинистость... Красновато-желтый, иногда с более темным брюшком и верхом головы..."), с достаточной степенью уверенности можно полагать, что речь идет о *T. inerne* Mayr.

2. *T. semilaeve* var. *schmidti*, For.: Рузский, 1905:538, ♀, Крым, Феодосия; Ашхабад; Кагаважев, 1926с:293, ♀, Симферополь.

Указания Караваяева из Симферополя относятся к *T. semilaeve* Andre (материал