

УДК 595.796

## Новые виды муравьев рода *Leptothorax* (Hymenoptera, Formicidae) из Южной и Восточной Палеарктики

А.Г.Радченко

Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена АН Украины, 252601 Киев ГСП, Украина

**Нові види мурашок роду *Leptothorax* (Hymenoptera, Formicidae) з Південної та Східної Палеарктики. Радченко А.Г.** — Описано 7 нових видів *Leptothorax* з Кавказу, Ірану, Таджикистану, Примор'я та Південних Курил.

**New Ant Species of the Genus *Leptothorax* (Hymenoptera, Formicidae) from Southern and Eastern Palearctics. Radchenko A.G.** — 7 new *Leptothorax* species are described from the Caucasus, Iran, Tadjikistan, Primorsky Krai, Southern Kurile islands.

В результате обработки коллекций Зоологического Музея Московского университета, а также материалов, любезно предоставленных А.Н.Купянской, было обнаружено 7 новых видов *Leptothorax* Mayr из Закавказья, Ирана, Средней Азии и Дальнего Востока, описываемых в статье. Характеристика индексов и промеров дана в предыдущих работах автора (Радченко, 1992); размеры и индексы голотипов приводятся в скобках. Считаю приятным долгом выразить искреннюю благодарность Г.М.Длусскому, А.Н.Купянской, а также сотрудникам Зоологического музея МГУ за предоставленную возможность обработки материала. Типы описываемых новых видов хранятся в коллекциях Зоологического музея Московского университета (ЗМ), Института зоологии им. И.И.Шмальгаузена АН Украины, Киев (ИЗ) и Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Российской Академии наук, Владивосток (БПИ ).

### *Leptothorax tamarae* Radtschenko, sp.n.

(рис. 1, a, b)

**Материал.** Голотип, рабочий, Грузия, Цагвери, n.30, 8.VI. 1963, Т.Жижилашвили (ЗМ).

Голова короткая, ИГ 0,98, с выпуклыми боковыми сторонами и слегка вогнутым затылочным краем; передний край наличника немного выпуклый. Усики 12-члениковые, скапус не достигает затылочного края головы на расстояние своего диаметра (ИС 1,33); 2-6-й членики жгутика усика поперечные, 7-8-й квадратные. Глаза широкоовальные, меньше щек, расположены посередине головы. Лоб и темя с прямыми продольными морщинками, между лбом и глазами морщинки соединены многочисленными перемычками, поверхность между морщинками пунктированная. Усиковые ямки окаймлены дуговидными морщинками, лобная площадка и наличник продольно морщинистые. Мандибулы с негрубыми морщинками. Грудь с развитым промезонотальным швом, но без мезопроподоального вдавления, в профиль выпуклая. Шипы проподоума слабо расширены у основания, прямые, средней длины, на концах слабо заостренные, направленные вверх и в стороны. Петиоль с короткой цилиндрической частью, его передняя поверхность слегка вогнутая, задняя слегка выпуклая, вершина узелка без площадки,