

Размеры: ДГ 0,69–0,72, ШГ 0,64–0,67, ДС 0,52–0,55, ДМ 1,25–1,32 мм.

Самцы (рис. 4, е, ф). Голова субквадратная, ИГ 0,97–1,03, широко закругленная за глазами, с слегка выпуклыми затылочным краем и передним краем наличника. Скапус относительно длинный, ИС 2,40–2,68, членики жгутика усика очень длинные, длина 2–8-го члеников примерно в 3 раза больше ширины, они почти такой же длины, как и членики булавы (кроме вершинного). Голова с морщинками и пунктировкой между ними. Грудь довольно высокая, с выпуклым пронотумом, ИМ 1,60–1,70. Пропедеум с прямоугольными буграми. Петиоль низкий, длинный, с слабо выраженным, закругленным на вершине узелком; постпетиоль по высоте примерно равен петиолю, закруглен сверху. Скутум лишь в задней части с нерезкими морщинками, в остальной части, как и скутеллум, гладкий и блестящий. Бока груди с густыми негрубыми морщинками, лишь передняя часть мезоплевр гладкая и блестящая. Петиоль с боков с шагреневой скульптурой и штриховатыми морщинками, вершина узелка гладкая и блестящая, постпетиоль сверху также гладкий и блестящий, лишь в задней части с шагреню и морщинками. Тело с короткими необильными отстоящими волосками, ноги и скапус с прилежащим опушением. Тело темно-бурое, усики и ноги охристые.

Размеры. ДГ 0,44–0,50, ШГ 0,43–0,52, ДС 0,17–0,21, ДМ 0,98–1,16 мм.

Своеобразный вид, относящийся к группе *L. bulgaricus*; хорошо отличается от всех входящих в эту группу видов наличием длинных острых зубцов на пропедеуме рабочих.

Экология не изучена.

***Leptothorax singularis* Radtschenko, sp.n.**

(рис. 5, а–д)

Материал. Голотип, рабочий, Таджикистан, Сангдара, ущ. Хомбон, 20 км от Новодада, орехо-плодный лес, 1500 м, н.б. 27.VIII.1970, В.Янушев (ЗМ). Паратипы: 6 рабочих, 1♀, из того же гнезда (ЗМ, ИЗ).

Рабочие (рис. 5, а, б). Голова средней длины, ИГ 1,16–1,24 (1,16), с слегка выпуклыми боковыми сторонами, широко закругленными затылочными углами и прямым затылочным краем, передний край наличника выпуклый. Усики 12-члениковые, скапус очень длинный в сравнении с другими видами рода, ИС 1,16–1,18, достигает или даже немного выходит за затылочный край головы; членики жгутика усика удлиненные, членики булавы особенно длинные, длина булавы почти равна длине остальной части жгутика. Глаза средних размеров, немного меньше щек, расположены посередине головы. Голова гладкая и блестящая, лишь возле глаз заметны нерезкие морщинки; мандибулы гладкие и блестящие. Грудь низкая, длинная, с неглубоким, но явственным мезопропедеальным вдавлением. Пропедеум с маленькими тупыми зубцами. Петиоль с явственной цилиндрической частью, низкий, его передняя поверхность пологая, слегка вогнутая; узелок в профиль клиновидный, с приостренной или очень узко закругленной вершиной; постпетиоль плавно закруглен на вершине, в высоту немного больше, чем в ширину. Вся переднегрудь и мезонотум гладкие и блестящие, негрубые морщинки имеются на пропедеуме и мезоплеврах. Членики стебелька с короткими морщинками. Шагреневая скульптура на теле не выражена. Голова,