



Рис. 2. Скапус (*a — я, d — m* — сбоку) и задняя голень *a' — я'*, *d' — m'* самцов: *a* — *M. arnoldii*, *b* — *M. tschekanovskii* (голотип), *c* — *M. rubra*, *g* — *M. ruginodis*, *d* — *M. dshungarica*, *e* — *M. juglandeti* (аллотип), *ж* — *M. kurokii*, *з* — *M. luteola* (паратип), *и* — *M. sulcinodis*, *к* — *M. aspersa* (паратип), *л* — *M. bicolor* (паратип), *м* — *M. kasczenkoii*, *и* — *M. saposhnikovi*, *о* — *M. angulinodis*, *н* — *M. transsibirica* (паратип), *р* — *M. kamtschatica* (паратип), *с* — *M. forcipata*, *м* — *M. jessensis*, *у* — *M. lobicornis*, *ф* — *M. kirgisorum* (паратип), *х* — *M. pisarskii* (паратип), *ц* — *M. zojae* (паратип), *ч* — *M. schencki*, *ш* — *M. lacustris*, *щ* — *M. caucasicola* (паратип), *э* — *M. ravasinii*, *ю* — *M. tenuispina*, *М* — *M. orthostyla* (паратип); *d* — *M. rugulosa*, *f* — *M. bergi*, *g* — *M. gallienii*, *h* — *M. stangeana*, *я* — *M. bessarabica*, *ж* — *M. scabrinodis*, *л* — *M. sabuleti*, *м* — *M. slovaca*.