



Рис. 3. Стебелек и проподеум рабочих в профиль (*a*, *b*, *j*, *z*, *n*, *p*), то же самое (*e*, *g*) грудь и стебелек рабочих в профиль (*d*, *k*) голова рабочего спереди (*w*), часть головы рабочих с усиковой ямкой (*e*, *m*, *o*): *a* — *M. arnoldii* (паратип); *b* — *M. tschekanovskii* (паратип); *e* — *M. luteola* (паратип); *g* — *M. forcipata*; *d* — *M. kurokii*; *e*, *j* — *M. rubra*; *z* — *M. ruginodis*; *w* — *M. dshungarica* (*u*, *k* — лектотип); *m*, *n* — *M. juglandetii* (паратип); *o* — *M. ferganensis* (синттип); *n* — *M. tenuispina* (синттип); *p* — *M. orthostyla* (голотип)

- 6(61) Усиковые ямки окаймлены дуговидными морщинками, либо являющимися продолжением загибающихся наружу лобных валиков, либо причленяющимися к ним (рис. 3, *e*, *u*, *m*, *o*).  
 7(8) Проподеум самок без шипов, лишь с тупыми бугорками (рис. 3, *e*). Половые особи мельче рабочих. Скапус рабочих согнут довольно круто, но без уголка на стибе (рис. 1, *k*); голова субквадратная ( $HI = 0,98—1,03$ ); грудь сверху без морщинок, с грубой неправильной петлеобразной скульптурой. Мезопроподеальное вдавление резкое; все тело, ноги и скапус с длинным густым отстоящим опущением. Тело оранжевое или оранжево-буровое. Размеры крупные:  $HL = 1,33—1,51$ ;  $TL = 1,92—2,33$  мм.— Приморье, о-в Кунашир . . . . . *M. luteola* Kupianskaya, 1990  
 8(7) Проподеум самок всегда с явственными шипами (рис. 3, *g*). Половые особи крупнее рабочих. Набор признаков рабочих иной.