



Рис. 6. Голова рабочих спереди (а, б, и), стебелек и проподеум в профиль (в, г, ж, з), грудь и стебелек в профиль (д, е): а — *M. rugulosa*; б — *M. bergi* (синтип); г — *M. gallienii*; д — *M. strangeana* (лекотип); е — *M. bessarabica*; ж — *M. slovaca* (паратип); з — *M. scabrinodis*; и — *M. carinata* (голотип)

- 2, ♂). Степи и лесостепи от низовьев Днепра до Якутии, горы Средней Азии, северная Монголия *M. bergi* Ruzsky, 1902
 70(69) Шипы проподеума длинные, постпетиолюс высокий, его вершина сдвинута назад (рис. 6, г). Самцы: скапус короткий ($SI = 2,44—2,75$), 2-й членник жгутика длинный, не менее, чем в 1,5 раза длиннее 3-го (рис. 2, г).— Европа, юг Западной Сибири, Северный Кавказ
M. gallienii Bondroit, 1919
 71(62) Скапус согнут круто, на сгибе с уголком и с продольным зубчиком, закраинкой или лопастью (рис. 1, *l* — *t*).
 72(75) Скапус без развитой лопасти, согнут под тупым углом, лишь с закраинкой или зубцом (рис. 1, *l* — *m*).
 73(74) Петиолюс в профиль закругленно-треугольный, очень редко с нечеткой, короткой вершинной площадкой; шипы проподеума тонкие, не расширенные у основания; скульптура груди и стебелька из грубых правильных