



Рис. 1. *Leptothorax scamni*, неотип (а); *L. oceanicum*, неотип (б); *L. muscorum* (в — к): а, в — к — пропodeум и стебелек в профиль; б — грудь и стебелек в профиль, рабочие (в — Санкт-Петербург, г — Харьковская обл., д — Крым, е — Краснодарский край, ж — Армения, з — Юго-восточный Алтай, и — Тува, к — Приангарье)

- притупленные на концах. Узелок петиолюса с закругленной вершиной (рис. 1, а).— Кавказ, Закавказье, Малая Азия *L. scamni* Ruzsky, 1905
- 5 (4) Шипы пропodeума короче, всегда расширены у основания и заострены на концах (рис. 1, б).
- 6 (7) Отстоящие волоски на теле очень редкие, единичные. Петиолюс в профиль треугольный, узелок с заостренной вершиной (рис. 1, б). Грудь и стебелек с густой шагреневой скульптурой, без морщинок.— Приморье, юг Хабаровского края, Амурская обл. . . *L. oceanicum* Kuznetsov-Ugamskij, 1928, stat. n. = *L. muscorum oceanicum* Кузнецов-Угамский, 1928 : 29
- 7 (6) Отстоящие волоски на теле многочисленные. Форма петиолюса варьирует, но узелок никогда не бывает с заостренной вершиной, вершинная площадка всегда имеется (рис. 1, в — к). По крайней мере на верху груди есть явственные продольные морщинки.— Транспалгаркт *L. muscorum* (Nylander, 1846)
- 8 (1) Антенны 12-члениковые.