



Рис. 2. *Leptothorax serviculus*, неотип (а), *L. kurilensis*, голотип (б), *L. brauneri*, неотип (в), *L. werneri*, голотип (г, д), *L. anodontoides*, параптип (е), *L. alpinus*, неотип (ж), *L. congruus* (з): а — г, е — грудь и стебелек в профиль; д — грудь сверху; ж, з — голова спереди (рабочие)

- 9 (36) Тело одноцветное, от красно-бурового до черного.
- 10 (29) Голова полностью густо скульптирована, с морщинками и шагренью.
- 11 (12) Вся грудь с густой шагреневой скульптурой, без морщинок, со слабым мезопроподеальным вдавлением или без него (рис. 2, а).— Степи от Волги до Забайкалья, Монголия *L. serviculus* Ruzsky, 1902
- 12 (11) По крайней мере бока груди с явственными морщинками.
- 13 (16) Грудь сверху с промезонотальным швом.
- 14 (15) Клипеус без вырезки на переднем крае. Скапус не достигает затылочного края головы. Горизонтальная поверхность проподеума не короче покатой (рис. 2, б).— о-в Кунашир *L. kurilensis* Radtschenko, 1993
- 15 (14) Клипеус с вырезкой на переднем крае. Скапус немного выходит за затылочный край головы. Горизонтальная поверхность проподеума явственно короче покатой.— о-в Тайвань *L. taivanensis* Wheeler, 1929