



Рис. 3. *Leptothorax alpinus*, неотип (а), *L. congruus* (б), *L. tamarae*, голотип (в, г), *L. tesquorum*, паратип (д), *L. leoni*, паратип (е), *L. susamyri*, паратип (ж, з), *L. arpini*, паратип (и, к): а — в, д, е — грудь и стебелек в профиль; г, ж, и — голова спереди; з, к — грудь сверху (рабочие)

- 16 (13) Грудь сверху без промезонотального шва.
- 17 (18) Грудь с явственным мезопроподеальным вдавлением (рис. 2, в). Голова длинная ($HI = 1,23-1,28$).— Кавказ, Закавказье *L. brauneri* Ruzsky, 1905
- 18 (17) Грудь без мезопроподеального вдавления.
- 19 (20) Грудь и стебелек с густой шагреневой скульптурой, морщинки развиты лишь на боках переднегруди; про- и мезонотум сверху с дуговидными морщинками; проподеум с короткими тупыми зубчиками (рис. 2, з, д).— Центральный Кавказ *L. werner* Radtschenko, 1993
- 20 (19) Грудь морщинистая, если на ее боках преобладает шагреневая скульптура, то проподеум с длинными, тонкими шипами. На про- и мезонотуме дуговидных морщинок нет.