

- 21 (22) Проподеум без зубчиков, самое большое с тупыми буграми; грудь и стебелек очень грубо морщинистые (рис. 2, *e*). Тело черное.— Копетдаг *L. anodontoides* Dlussky et Zabelin, 1985
- 22 (21) Проподеум с маленькими острыми зубчиками или длинными шипами.
- 23 (26) Проподеум с маленькими острыми зубчиками (рис. 3, *a*, *b*).
- 24 (25) Голова длинная (*HI* = 1,26—1,33), с многочисленными тонкими морщинками (рис. 2, *ж*).— Закавказье *L. alpinus* Ruzsky, 1902
- 25 (24) Голова короче (*HI* = 1,15—1,20), с более грубыми и редкими морщинками (рис. 2, *з*).— Япония, Приморье *L. congruus* F. Smith, 1874
- 26 (23) Проподеум с шипами (рис. 3, *в*, *д*).
- 27 (28) Крупнее: *HL* = 0,78; *TL* = 1,04 мм. Голова короткая (*HI* = 0,98), с выпуклыми боковыми сторонами (рис. 3, *г*). Грудь и стебелек грубо морщинистые, блестящие, шагрень развита лишь в нижней части мезоплевр; петиолюс массивный, со слегка вогнутой передней и выпуклой задней поверхностями; шипы проподеума короче (рис. 3, *в*). Тело красновато-бурое.— Грузия *L. tamarae* Radtschenko, 1993
- 28 (27) Мельче: *HL* меньше 0,70; *TL* меньше 0,90 мм. Голова удлиненная (*HI* больше 1,20), с параллельными боковыми сторонами. Бока груди и членники стебелька с шагреневой скульптурой; шипы проподеума длинные, острые, тонкие (рис. 3, *д*). Тело от темно-бурового до черного.— Степи от Причерноморья до Центрального Казахстана, Копетдаг *L. tesquorum* Arnoldi, 1971 (= *elderensis* Dlussky et Zabelin, 1985 : 225, syn. n.)
- 29 (10) Голова хотя бы в задней части гладкая и блестящая (рис. 3, *ж*, *и*).
- 30 (31) Грудь сверху без промезонотального шва.— Горный Крым *L. jajlensis* Arnoldi, 1977
- 31 (30) Грудь сверху с промезонотальным швом.
- 32 (33) Грудь с неглубоким мезопроподеальным вдавлением (рис. 3, *е*).— Центральный Казахстан *L. leoni* Arnoldi, 1971
- 33 (32) Грудь без мезопроподеального вдавления.
- 34 (35) Лоб, темя, затылок и верх узелка постпетиолюса гладкие и блестящие (рис. 3, *ж*). Про- и мезонотум с сильно слаженной, нежной поверхностью шагреневой скульптурой (рис. 3, *з*).— Тянь-Шань: долина р. Сусамыр *L. susamyrri* Dlussky, 1965
- 35 (34) Голова с более выраженной скульптурой, по крайней мере нижняя часть лба и бока головы с нежными морщинками (рис. 3, *и*); верх узелка постпетиолюса с шагреневой скульптурой. Про- и мезонотум с шагренью и негрубыми морщинками (рис. 3, *к*).— Тянь-Шань *L. arpini* Tarbinsky, 1976 (= *narinicus* Tarbinsky, 1976 : 93, syn.n.)
- 36 (9) Тело либо двуцветное (брюшко темнее груди), либо одноцветно желтое или оранжево-желтое.
- 37 (60) Голова со слаженной скульптурой, по крайней мере лоб и темя гладкие и блестящие.
- 38 (39) Грудь с грубыми продольными морщинками; петиолюс с явственной цилиндрической частью, его передняя поверхность пологая, узелок массивный, низкий, широко закругленный на вершине; шипы проподеума слабо расширены у оснований, острые (рис. 4, *а*). Голова совершенно гладкая и блестящая, лишь возле глаз имеются нежные штриховатые морщинки (рис. 4, *б*). Грудь оранжево-желтая, верх головы красновато-бурый, брюшко бурое со светлым пятном у основания первого тергита.— Иран *L. iranicus* Radtschenko, 1993
- 39 (38) Скульптура груди нерезкая, самое большое в виде нежных морщинок и шагрени. Петиолюс иной формы.
- 40 (41) Отстоящие волоски на теле длинные, изогнутые, заостренные на концах (как у видов *Tetnothorax*); грудь с мезопроподеальным вдавлением (рис. 4, *в*).— Таджикистан *L. singularis* Radtschenko, 1993