



Рис. 4. *Leptothorax iranicus*, голотип (а, б), *L. singularis*, голотип (в), *L. janushevi*, голотип (г), *L. satunini*, неотип (д), *L. oxianus*, неотип (е), *L. melleus* синтип (ж), *L. pamiricus*, по М. Д. Рузскому, 1905 (з), *L. pallidus*, паратип (и): а, г — пропodeум и стебелек в профиль; б, в, з, и — грудь и стебелек в профиль; б, д — ж — голова спереди (рабочие)

- 41 (40) Отстоящие волоски на теле короткие, прямые, притупленные на концах. Грудь без мезопроподеального вдавления.
- 42 (43) Проподеум с шипами (рис. 4, г).— Гиссарский хребет . . . . . *L. janushevi* Radtschenko, 1993
- 43 (42) Проподеум с короткими зубчиками.
- 44 (45) Голова, брюшко и пятна на груди бурые, остальное тело желтое. Голова гладкая и блестящая.— П-ов Челекень (Прикаспий), Узбекистан: Кашка-Дарьинская обл. . . . . *L. fumosus* Ruzsky, 1923
- 45 (44) Тело одноцветное, желтое или красновато-желтое, лишь брюшко сверху может быть темнее.
- 46 (49) Лоб, темя и затылок гладкие и блестящие, остальные части головы с нежными морщинками и шагренью (рис. 4, д, е).
- 47 (48) Тело полностью желтое.— Закавказье . . . . . *L. satunini* Ruzsky, 1902
- 48 (47) Тело буровато-желтое, голова может быть слегка затемнена.— Горы Средней Азии . . . . . *L. oxianus* Ruzsky, 1905 (= *talassicus* Tarbinsky, 1976: 101, syn. n.)
- 49 (46) Скульптура головы более сглажена, нежные морщинки, если имеются, могут быть лишь возле глаз (рис. 4. ж).