



Рис. 5. *Leptothorax kirgisticus*, паратип (а), *L. cornibrevis*, по Collingwood, 1960 (б), *L. shelkovnikovi*, синитип (в), *L. melleus*, синитип (г), *L. alinae*, голотип (д), *L. volgensis*, неотип (е), *L. melnikovi*, по Рузскому, 1905 (ж), *L. steinbergi*, паратип (з): а — з — грудь и стебелек в профиль (рабочие)

- 50 (53) Верх и частично бока груди гладкие, блестящие.
- 51 (52) Вершина узелка петиолюса широко закруглена; пропodeум с короткими зубчиками (рис. 4, з).— Памир; Зеравшанский хребт (по Рузскому) .
 *L. pamiricus* Ruzsky, 1902
- 52 (51) Петиолюс в профиль клиновидный, узелок с заостренной вершиной; зубчики пропodeума длиннее, слабо расширенные у основания (рис. 4, и).— Центральный Афганистан *L. pallidus* Collingwood, 1960
- 53 (50) Грудь с нежной шагреневой скульптурой и штриховатыми морщинками, самое большее, верх про- и мезонотума могут быть со сглаженной скульптурой.
- 54 (55) Передняя поверхность петиолюса прямая, крутая, узелок высокий, заостренный на вершине (рис. 5, а).— Северо-западный Кыргызстан . .
 *L. kirgisticus* Tarbinsky, 1976
- 55 (54) Передняя поверхность петиолюса слабо вогнутая, более пологая; узелок с закругленной вершиной (рис. 5, б — г).
- 56 (57) Петиолюс низкий, узелок широко закруглен на вершине (рис. 5, б) — Северный Афганистан *L. cornibrevis* Collingwood, 1960