



Рис. 6. *Leptothorax nylanderi* (а, б), *L. parvulus* (в, г), *L. clypeatus* (д), *L. caucasicus*, паратип (е, ж), *L. anodonta*, паратип (з): а, в — грудь и стебелек в профиль; б, г — проподоум сверху; ж, з — голова спереди (а, б, д — з — рабочие; б, г — самки)

- 76 (75) Грудь без промезонотального шва. Если шов развит, то петиолус низкий с развитой цилиндрической частью и очень массивным, широко закругленным или уплощенным на вершине узелком (рис. 6, д).
- 77 (82) Петиолус низкий, с развитой цилиндрической частью, узелок очень массивный, широко закруглен или уплощен на вершине; проподоум с очень короткими, широкими зубчиками или лишь с прямоугольными бугорками; грудь грубо морщинистая, шагреневая скульптура развита слабо (рис. 6, е).
- 78 (79) Тело одноцветно желтое. — Южное Закавказье . . . *L. korbi* Emery, 1896
- 79 (78) Грудь и стебелек красновато- или буровато-желтые, голова и брюшко бурые.
- 80 (81) Грудь сверху с промезонотальным швом. Голова короче ( $HI = 1,09-1,19$ ), клипеус с вырезкой на переднем крае; лоб и бока головы с грубыми морщинками, темя и затылок с штриховыми морщинками (рис. 6, ж). — Закавказье, Копетдаг . . . . .  
*L. caucasicus* Arnoldi, 1977 (= *hasardaghi* Dlussky et Zabelin, 1985 : 226, syn. n.)
- 81 (80) Грудь без промезонотального шва. Голова длиннее ( $HI = 1,24-1,31$ ), наличник без вырезки на переднем крае; лоб с негрубыми многочис-