



Рис. 7. *Leptothorax nassonovi*, неотип (а), *L. knipovičschi*, синтип (б), *L. affinis* (в), *L. discoloratus*, голотип (г), *L. mongolicus*, паратип (д), *L. archangelskii*, лектотип (е), *L. tianshanicus*, паратип (ж, з), *L. corticalis* (и), *L. tauricus*, неотип (к), *L. unifasciatus* (л): а — ж, к, л — грудь и стебелек в профиль; з, и — голова спереди (рабочие)

- ленными морщинками, темя и затылок с густой шагреневой скульптурой (рис. 6, з).— Армения *L. anodontata* Arnoldi, 1977
- 82 (77) Петиолюс иной формы. Если пропodeум с короткими зубчиками, то грудь с неглубокими морщинками и шагреневой скульптурой.
- 83 (88) Пропodeум с длинными, искривленными вниз шипами, длина которых равна или лишь немного меньше горизонтальной поверхности пропodeума (рис. 5, е; 7, а, б).
- 84 (85) Шипы пропodeума очень мощные, расширенные у основания, равны или длиннее горизонтальной поверхности пропodeума (рис. 7, а). Грудь и стебелек желто-оранжевые, голова затемнена, брюшко черно-бурое, лишь иногда имеется маленькое светлое пятно у основания I тергита.— Степи от восточной Украины до Забайкалья, Амурская обл., Приморье, Монголия *L. nassonovi* Ruzsky, 1895
- 85 (84) Шипы пропodeума не расширенные у основания, если расширенные, то