

Задние голени по внутреннему краю с волосками, отстоящими под углом  $45^\circ$ .

На пронотуме прямые многочисленные отстоящие волоски (как на голове), на мезонотуме и проподеуме по 2—3 волоска; волоски на брюшке располагаются по всей поверхности тергитов и стернитов.

Голова, грудь и стебелек оранжево-желтые, ноги и брюшко охристо-желтые, лишь задняя половина 2-го тергита брюшка бурая.

Размеры: ДГ=1,2, ШГ=0,83, ДС=1,65, ДМ=1,89 мм.

**Дифференциальный диагноз.** Описываемый вид принадлежит к условной группе видов подрода *Attomyrma* с сильно суженной за глазами головой без обозначенных затылочных углов (*A. rothneyi* Fог., *A. cristata* Fог., *A. schurri* Fог., *A. januschevi* К. Агп.) и наиболее близок к последнему. Отличается от *A. januschevi* скульптурой головы, выпуклой основной поверхностью проподеума и размерами его шипиков, а также формой петиоля и постпетиоля. От других видов отличается цветом, скульптурой тела и др.

Все известные ранее виды рассматриваемой группы известны из Гималаев, гор Средней и Центральной Азии, из Центральной Индии (Forel, 1902; Bingham, 1903; Emery, 1908; Арнольди, 1976).

Описываемый вид, по всей видимости, также имеет центральноазиатские корни и должен быть найден в Иране, и, возможно, далее на востоке в горах Афганистана.

#### *Cataglyphis machmal* Radtschenko et Arakelian, sp. n.

**Материал.** 1 крупный рабочий (голотип) и 15 рабочих (паратипы — рисунок, 3, 4), Армения, Абовянский р-н, склоны г. Адис, № 118—88, 7.06.1988, гнездо на сухом каменистом склоне с изреженной растительностью, в земле, А. Радченко, Г. Аракелян (ИЗАНУ, ИЗАНА).

Голова с параллельными боковыми сторонами, у крупных рабочих задние углы закруглены, затылочный край прямой, ИГ=1,03—1,07; у мелких рабочих голова за глазами дугообразно выпуклая, ИГ=1,11—1,12. Скапус длинный, ИС=0,78—0,9, на наружном крае с многочисленными отстоящими волосками; длина по крайней мере части из них равна диаметру скапуса; полуотстоящие волоски грубые, лишь немного тоньше отстоящих, приподняты под углом  $15\text{--}20^\circ$ . Многочисленные длинные изогнутые белесые отстоящие волоски имеются на затылочном крае, на лбу, наличнике и снизу головы; вдоль нижнего края наличника расположен ряд длинных желтоватых хет.

Грудь с прилежащим опушением, особенно грубым и густым на мезоплеврах и проподеуме. Отстоящие волоски (как на голове) имеются на про- и мезонотуме, особенно обильные на проподеуме. На бедрах, голенях и лапках грубое полуотстоящее опушение, на внутренней поверхности всех бедер — тонкие, прямые белесые отстоящие волоски (у части особей такие же волоски имеются на наружной поверхности средних и задних голеней); на внутренней поверхности всех голеней — негрубые желтые шипики.

Многочисленные длинные отстоящие волоски на брюшке располагаются на всей поверхности тергитов и стернитов.

Поверхность тела очень нежно скульптурирована, матовая.

Голова, грудь, стебелек и конечности красно-бурые, брюшко темно-бурое до черного.

Размеры: крупные рабочие: ДГ=1,53—2,75, ДС=1,95—3,05, ДМ=2,73—4,2 мм; мелкие рабочие: ДГ=1,15—1,16, ДС=1,46—1,54, ДМ=1,96—2,18 мм.

**Дифференциальный диагноз.** Описываемый вид относится к видам группы *C. bicolor* F.—*C. nodus* Brulle — *C. setipes* Forel подрода *Cataglyphis* s. str. и наиболее близок к *C. nodus*. В свете современных представлений по систематике данного рода, наиболее четко