

# PSELAPHIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par A. RAFFRAY.

## TROISIÈME MÉMOIRE (1)

### *Articerus foveicollis* n. sp.

Pl. I, fig. 1.

Long., 2 2/3 mill. — Oblongus, antice attenuatus, minus deplanatus, rufoferrugineus, et (abdomine excepto) breviter fulvo-pilosus. Caput elongatum, medio ante oculos sinuatum, juxta collum angulato-ampliatum et nigromaculatum, grosse punctatum. Antennæ capite plus duplo longiores; clava intus leviter sinuata, apice latiori et abrupte truncata, subrugose punctata. Thorax subhexagonus, brevis, antice plus, postice minus attenuatus, basi bisinuatus, disco subgibbosus, basi fovea magna. Elytra thorace plus duplo longiora et fere duplolatiora, basi et apice oblique truncata, dense, minute subrugosopunctata. Abdomen elytris longius, vix latius, lœve, basi late transversim foveatum, ista fovea angulatim impressa, utrinque valde fasciculatum, lateribus extus, juxta foveam sinuatis et margine laterali interrupto; segmento primo superiori convexo et apice leviter elevato. Femoribus incrassatis, intermediis subtus angulatis, tibiis anticis et intermediis incurvis, et apice incrassatis.

Cette espèce est remarquable d'abord par sa taille supérieure à celle de toutes ses congénères, ensuite par sa forme moins aplatie, son corselet plus court et légèrement gibbeux.

Le seul individu que je connaisse est en assez mauvais état; je le suppose être un ♂.

Australie : Swan-River.

(1) Voir Premier Mémoire, *Revue d'Entomologie*, 1882, p. 1 et suiv. — Deuxième Mémoire, *l. c.*, 1883, p. 229 et suiv.