

**Laphidioderus capensis n. sp.**

Pl. I, fig. 2, 3.

Long., 2 1/5 mill. — Rufo-piceus, nitidus, totus sparsim et, in foveolis et segmentorum suturis densissime, ochraceo-squamosus. Caput subelongatum, valde deplanatum, antice posticeque coarctatum, tuberculo antennario magno, subdiviso; genis postice deflexis et squamosis; vertice juxta oculos foveis latis praedito; fronte medio minute foveolato. Oculi magni. Antennae medianam partem elytrorum attingentes, articulis 1<sup>o</sup> majori, 2<sup>o</sup> subovato, 3-7 submoniliformibus, longitudine decrescentibus, 8-9 moniliformibus, majoribus, 10 majori, obovato, 11 oblongo, praecedenti fere duplo longiori, apice rotundato. Thorax capiti longitudine et latitudine (oculis inclusis) aequali, antice plus, postice minus attenuatus, lateribus postice sinuatus, medio disci et utrinque late foveatus, disco obsolete trituberculatus. Elytra thorace vix longiora, basi latitudine subæqualia et apice fere duplo latiora; humeris nullis; basi valde bifoveata; striis suturali et discoidali validis et integris. Abdomen elytris latius et fere duplo longius; segmentis tribus primis dorsalibus subæqualibus, duobus primis ventralibus aequalibus. Metasternum breve, medio excavatum et utrinque tuberculo magno, obtuso instructum. Femoribus clavatis, tibiis anticis medio leviter incrassatis et ante apicem sinuatis, intermediis et posticis ad apicem leviter incrassatis et nonnihil sinuatis. ♀ incognita.

Toutes les fossettes, la base et les côtés de la tête et du corselet, le sommet des élytres, la base des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> segments abdominaux, la poitrine et les sutures des deux premiers segments ventraux sont munis d'une pubescence squameuse, jaunâtre, très épaisse et très serrée. L'excavation du metasternum est limitée de chaque côté par un gros tubercule, dont la pointe obtuse vient sur les cuisses. C'est peut-être là un caractère sexuel. Les trois individus que je possède et que je dois à la gracieuseté de M. Peringuey sont tous des ♂ et ont été trouvés par lui au Cap de Bonne-Espérance, dans les galeries de la *Bothroponera pumicata* Ray.

**Enoptostomus formicarius** Raffr., *Revue et Mag. de Zoologie*, 1877.

La description que j'ai donnée de cette espèce (*loc. cit.*) se rapporte au ♂. La ♀ est un peu différente.