

♀. Antennarum articulis 1-7 sicut in mare, attamen minus compactis, 8<sup>o</sup> transverso, cæteris minori, 9<sup>o</sup> transverso, præcedenti majori, 10<sup>o</sup> fere subquadrato, præcedenti fere sesqui majori, ultimo multo majori obovato. Elytris quam in mare brevioribus.

J'ai repris cette espèce un peu partout sur les hauts plateaux d'Abyssinie : Enderta ; Haramat ; Geralta ; Mont Aladjie ; très rarement avec des fourmis.

**Enoptostomus nitidulus n. sp.**

Long., 4 1/3 mill. — Rufo-testaceus, nitidus, lœvis, parce et brevissime pallide setosus. Caput trifoveatum, foveola anteriori ad tuberculi antennarii basim sita, minuta ; cæteris in vertice magnis; tuberculo antennario basi constricto, apice ampliato, subdiviso ; vertice transverso ; utrinque juxta collum dense flavo-squamsum. Palporum articulis magnis, ultimo majori. Antennæ minus crassæ, ♀ articulis 1-2 multo majoribus, 2<sup>o</sup> ovato, 3-7 minoribus, submoniliformibus, 8<sup>o</sup> minori, transverso, 9-10 subtransversis, 9<sup>o</sup> magnitudine septimo vix majori, 10<sup>o</sup> majori, ultimo magno, breviter ovato. Thorax capite major, valde trifoveatus, fovea media oblonga, foveis dense flavosquamosis. Elytra thorace vix sesqui longiora, apice leviter ampliata et dense flavosquamosa, disco dilutiore, basi foveolis duabus squamosis et striis duabus integris. Abdomen elytris longius et nonnihil latius, segmento primo (conspicuo) apice dense squamoso, 2<sup>o</sup> præcedenti fere duplo longiori. ♂ incognitus.

Cette espèce est un peu plus petite que les *globulicornis* Mots. et *formicarius* Raffr., auxquels elle ressemble ; sa coloration est plus claire, surtout sur les élytres, sa pubescence moins abondante ; les antennes sont relativement plus grêles avec les deux premiers articles plus forts et le dernier plus brièvement ovoïde ; le second segment de l'abdomen est plus grand.

Je n'en connais que deux ♀, qui m'ont été données par M. Lewis et qui ont été trouvées dans les montagnes du Hedjaz (Arabie) par le Dr Millingen.

**Desimia frontalis n. sp.**

Long., 1 1/2 mill. — Oblongus, rufus, nitidus, breviter remote ochraceo-pilosus. Caput minutum, elongatum ; tuberculo antennario valido, vix bipartito ; trifoveatum, foveis in vertice leviter ele-