

vato majoribus. Oculi magni. Palpi minuti, testacei, articulis 2° curvato, apice leviter clavato, 3° oblongo, apice truncato, extus angulato, 4° subconico, apice acuto. Thorax capite multo latior, antice plus, postice minus attenuatus, parum convexus, basi trifoveatus, foveis, media majori, lateralibus valde fasciculatis. Elytra thorace majora, antice attenuata, nonnihil convexa, stria suturali valida, integra, dorsali valida sed ad medium evanescenti; margine postico valde fasciculato. Abdominis segmento 2° primo fere duplo longiori. Femoribus anticis leviter curvatis et intus ciliatis.

♂. Antennæ elongatæ, thoracis basim superantes, clava 4-articulata, articulis 1-2 majoribus, 3° minori, subconico, 4-7 moniliformibus, 8-11 simul sumptis dimidiata partem antennæ superantibus, 8-10 cylindricis, ultimo majori, oblongo, apice attenuato.

♀. Antennæ vix breviiores, clava triarticulata, articulis 4-8 moniliformibus, leviter amplitudine crescentibus, 9-10 multo longioribus, vix crassioribus, oblongis, ultimo longiori, leviter crassiori, apice attenuato.

Cette espèce diffère du *Ghiliani* Aubé par sa coloration plus claire, sa forme beaucoup moins convexe et surtout par la longueur de ses antennes ; du *Sharpi* Raffr. par sa taille plus grande, et ses antennes plus allongées.

Quelques exemplaires à Kiloa (côte du Zanzibar), sous des pierres, dans un terrain argileux ; janvier.

Desimia arabica n. sp.

Long., 1 5/6 mill. — Suboblongus, rufotestaceus, remote punctulatus, parum nitidus, remote ochraceo-pilosus. Caput parvum, antice attenuatum, valde trifoveatum, fovea anteriori minori; vertice leviter elevato; tuberculo antennario producto, bifido, utrinque subauriculato. Antennæ validæ, crassæ, thoracis basim superantes, articulis 1-2 majoribus, 3-8 moniliformibus, nonnihil oblongis, 9-10 majoribus, oblongis, ultimo oblongo, majori, apice attenuato. Thorax capite major, antice attenuatus, leviter convexus, trifoveatus, fovea media multo majori. Elytra thorace multo majora, antice minus attenuata, humeris subobliqua, basi bifovealata et bisulcata, striis suturali et dorsali integris, margine apicali dense ochraceo-setoso. Abdominis segmento primo brevi, secundo plus duplo longiori.

Cette espèce se distingue par sa taille, sa couleur assez claire, sa pubescence setiforme plus longue et plus abondante, les énormes fossettes de sa tête et le tubercule antennifère bilobé.