

J'en possède deux exemplaires que M. Lewis m'a donnés comme venant du Taïf (montagnes du Hedjaz, Arabie).

Desimia depilis n. sp.

Long., 1 1/4 mill. — Suboblongus, rufus, nitidus, brevissime vix pilosus. Caput breve, postice latius, trifoveatum, tuberculo antennario minuto, parum producto. Antennæ breves, crasse, clava triarticulata; ♀. articulis duobus primis majoribus, 3-8 moniliformibus, 9-10 majoribus, subquadratis, ultimo multo majori, suboblongo, apice rotundato. Thorax capite major, subconvexus, antice plus, postice vix attenuatus, lateribus medio subrotundatus, trifoveatus, foveis minutis, lateralibus fasciculatis. Elytra antice valde attenuata, leviter convexa, basi bifovealata et bisulcata, sulco suturali medio evanescenti in stria integra usque ad apicem prolongata, sulco dorsali medio abbreviato, margine apicali dense ochraceo-ciliato. Abdomen elytris latitudine subæquale, segmentis 1° apice dense ochraceo-ciliato 2° primo fere triplo longiori. Femoribus crassis, tibiis anticis medio incrassatis et leviter incurvis.

Cette espèce est voisine de la *subcalva* Reitt., mais la couleur est plus claire la forme moins allongée et plus convexe, le tubercule antennaire moins prononcé; enfin la pubescence est moins rare.

Un exemplaire, sans nul doute ♀, pris à Kilva (côte du Zanguebar), sous des pierres, dans un terrain argileux; janvier.

Ctenistes zanzibaricus n. sp.

Long., 2 mill. — Rufocastaneus, margine postico elytrorum et abdomine leviter infuscatis, parce pilosus, capite juxta collum et tuberculum antennarium, elytrorum margine apicali et segmenti primi abdominalis sutura densissime pallide squamosis. Caput oblongum, tuberculo antennario vix sulcato, sed basi cum fovea longitudinali valida et valde constricto, vertice juxta oculos bifovealatum. Palporum articulis 3° triangulatim subovato, 4° obovato, apice acuminate; duobus ultimis longissime penicillatis. Thorax capiti longitudine subæqualis, et (absque oculis) basi duplo latior, fere obconicus. Elytra antice attenuata, humeris obsolete obliquis, parum elevatis, striis suturali et dorsali integris et validis. Abdomen elytris subæquale, segmento 2° (conspicuo) præcedenti fere duplo longiore.