

♂. Antennæ valde elongatæ, articulis 1-2 majoribus, 3-7 moniliformibus, minutis, transversis, 8^o præcedentibus septem simul sumptis longiori, 9^o breviori, 10^o præcedenti longiori sed octavo adhuc leviter breviori, ultimo præcedenti longitudine subæquali, ad apicem non-nihil incrassato et obtuse subacuminato.

♀. Incognita.

C'est au *C. deserticola* Raffr., d'Abyssinie, que cette espèce ressemble le plus, surtout par les antennes du ♂; mais elle en diffère par la taille plus grande, le corps plus étroit surtout postérieurement, la couleur plus claire, le tubercule antennaire plus étranglé à la base.

Elle ne peut être comparée au *Kiesenwetteri* Rag., dont les antennes sont beaucoup plus courtes, plus épaisses. Elle offre encore de grandes analogies avec le *ammenensis* Raffr.; mais les antennes du ♂ sont plus longues, surtout la massue, les 3 et 4 articles des palpes plus globuleux, moins allongés, la forme générale plus allongée, la pubescence squameuse plus grosse et le tubercule antennifère plus étranglé à la base. Comparé au *palpalis*, il en diffère par ses antennes bien plus longues, le dernier article des palpes moins allongé, la tête moins élargie, la forme plus allongée, les 1^{er} et 2^e (visibles) segments dorsaux, surtout le 2^e, plus grands.

Un seul exemplaire ♂, dans un marais au pied des joncs, près de la ville de Zanzibar ; septembre.

Ctenistes australis n. sp.

Long., 1 4/5-2 mill. — Fulvus, elytris, pedibus palpisque dilutioribus (♀ obscurior), parcissime ochraceo-squamosus. Capite juxta collum, thoracis et elytrorum foveis et apice dense pallido-squamosis. Caput oblongum, trifoveatum, fovea anteriori minori, oblonga, tuberculo antennario basi constricto, vix sulcato. Palpi minores, articulis 3-4 subovatis. Thorax capite (absque oculis) haud duplo latior nec longior, antice plus, postice minus attenuatus, lateribus leviter rotundatus, basi foveatus. Elytra antice leviter attenuata, humeris oblique rotundatis, striis dorsali et suturali integris. Abdominis segmento 2^o (conspicuo) præcedenti fere duplo longiori.

♂. Gracilior, minor et dilutior. Antennarum articulis 1-2 majoribus, 5-7 minutissimis, moniliformibus, 8^o præcedentibus septem simul sumptis longitudine æquali, 9^o præcedenti fere dimidio breviori, 10^o nono paulo longiori, 11^o præcedenti æquali, apice acuminato.

♀. Crassior, major et obscurior. Antennæ crassæ, fere tertia parte