

quam in ♂ breviores, articulis 1-2 majoribus, 3<sup>o</sup> longiori, oblongo, 4-6 leviter brevioribus, inter se subæqualibus, 7<sup>o</sup> præcedenti fere duplo longiori, 8<sup>o</sup> sexto multo minori, tribus ultimis majoribus, clavatis, 9<sup>o</sup> subgloboso, 10<sup>o</sup> subquadrato, ultimo decimo fere duplo longiori, oblongo, apice acuminato.

Cette jolie petite espèce se distingue facilement par ses palpes plus petits, dont les deux derniers articles sont ovoïdes. Sous ce rapport elle se rapproche du *Zanzibaricus* Raffr., mais elle est plus petite et d'une couleur bien plus claire.

La ♀ décrite ci-dessus pourrait bien appartenir à une autre espèce ; sa taille est plus forte, plus épaisse, sa coloration plus foncée, mais les palpes sont absolument semblables.

J'en ai vu quelques exemplaires du Cap, communiqués par M. Perringuey, qui a bien voulu en enrichir ma collection.

#### **Ctenistes parviceps n. sp.**

Long., 1 2/3 mill. — Rubro-castaneus, elytris interdum disco dilutioribus, nitidus, parce pilosus; capite juxta collum, thorace basi et in foveis, elytris apice et abdomine basi et segmento primo apice dense squamosis. Caput oblongum, tuberculo antennario minori et basi minus constricto, sulcato, vertice, juxta oculos, bifoveatum. Palporum articulis 3<sup>o</sup> valde triangulari, 4<sup>o</sup> maxime elongato, subfusciformai. Thorax capite fere duplo latior, nonnihil longior, antice plus, postice minus attenuatus. Elytra antice attenuata, humeris obliquis, leviter elevatis, striis dorsali et suturali validis, integris. Abdomen elytris subæquale, segmento 2<sup>o</sup> (conspicuo) præcedenti paulo longiori.

♂. Antennarum articulis 1-2 majoribus, 3-7 moniliformibus, minutissimis, 8<sup>o</sup> præcedentibus simul sumptis longiori, 9-11 inter se subæqualibus et octavo leviter brevioribus, 9<sup>o</sup> attamen nonnihil minori, ultimo apice acuminato.

♀. Antennarum articulis 1-2 majoribus, 3-7 oblongis, 7<sup>o</sup> præcedenti paulo longiori, 8<sup>o</sup> plus duplo minori, subquadrato, 9<sup>o</sup> majori, breviter ovato, 10<sup>o</sup> longiori, ovato, ultimo oblongo, crassiori, apice subacuminato.

Comparée au *palpalis* Rcb. et au *Kiesenwetteri* Rag., elle diffère par la couleur bien plus foncée et plus rouge, la pubescence plus claire, la tête plus petite, le tubercule antennaire beaucoup moins rétréci à la base, ce qui le fait paraître moins gros, et aussi