

vespertinus; les carènes des élytres sont moins prononcées que dans les autres espèces.

Je n'ai pu prendre que deux exemplaires de cette espèce, tous les deux ♂, en fauchant le soir, dans les prairies marécageuses, autour de la ville de Zanzibar.

Tmesiphorus collaris Raffr., Revue et Mag. de Zoolog., 1877.

Losque j'ai décrit cet insecte, je n'en connaissais que des ♀; j'en ai repris depuis plusieurs exemplaires à Lindi et Mikindani (côte du Zanguebar), dans les mêmes conditions où je les avais précédemment trouvés, c'est-à-dire sous des écorces d'arbres, avec des fourmis. Dans le nombre il y avait plusieurs mâles; j'en donne les caractères distinctifs.

♂. Antennarum articulo 4^o subtus inciso, excavato et dentato, ultimo subtus oblique canaliculato et obtuse dentato.

Cette disposition des antennes chez le ♂ rapproche cette espèce du *denticornis* Raffr., d'Abyssinie, mais la massue est plus forte; il diffère en outre de ce dernier par la grosse ponctuation du corselet.

Pselaphocerus n. g.

Corpus crassum, convexum, antice attenuatum. Caput tuberculo antennario valido, lato præditum. Antennæ in utroque latere tuberculi insertæ et basi distantes, validæ, irregulariter clavatæ, articulis 1^o subelongato, cylindrico, 8^o cæteris minori. Palpi validi, quadriarticulati, articulis 4^o minuto, 2^o sat elongato, basi gracili, apice valde triangulatim dilatato, 3^o triangulari, extus plus minusve in apophysi vel obtuse dilatato, 4^o transversim triangulari, apice acuminate et appendice brevi munito, ad basim extus plus minusve in apophysi vel obtuse dilatato. Thorax subquadratus, longior quam latior, antice coarctatus, utrinque in latere, ad medium, foveatus. Elytra magna, convexa, antice attenuata, postice ampliata, stria discoïdali brevi. Abdomen magnum, marginatum, segmentis sex, quorum primo minuto, instructum, insuper segmento 2^o (primo conspicuo) cæteris vix longiori. Metasternum magnum, leviter elevatum. Coxæ posticæ vix approximatæ; trochanteres intermedii parum elongati, femoribus coxas non attingentibus. Pedes sat elongati, femoribus crassis, tarsis elongatis, articulis 2-3 subæqualibus, unguibus binis, æqualibus præditis.