

♂. Trochanteribus anticis apice obtuse dentatis, femoribus anticis medio dentatis, metasterno medio depresso. — ♀. Incognita.

Un exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringuay, auquel je dédie cette espèce.

Pselaphocerus heterocerus n. sp.

Pl. I. fig. 8, 9.

Long. 2 3/4 mill. — Suboblongus, convexus, antice attenuatus, rufus, lœvis, nitidus, elytrorum disco dilutiori, pilis brunneis minus longis parce vestitus. Caput elongatum, subdeplanatum, antice ante antennarum insertionem leviter coarctatum, tuberculo antennario apice diviso et basi sulcato, juxta oculos foveolis duabus. Palpi validi, articulis 3° subtriangulari, apice extus in apophysim longam, apice obtusam prolongato, 4° longe subovato, basi extus apophysa longa, apice obtusa, prædicto. Antennæ validæ, articulis 1° elongato, cylindrico, 2° obovato, 3-5 longioribus, oblongis, 6° subquadrato, 7° transverso, extus oblique producto, 8° minuto, lenticulari, 9° magno, globoso, 10° globoso, subtransverso, ultimo multo majori, obconico, intus basi subdentato, supra convexo, subtus basi rotundato-excavato, et margine interiori inciso. Thorax subquadrato-elongatus, capite longior et latior, antice abrupte valde coarctatus, lateribus rectis, medio in latere fovea magna transversa fundo squamosa, disco subconvexus. Elytra thorace duplo longiora, basi vix latiora, sed apice plus duplo latiora, convexa, humeris obliquis, bene indicatis, basi bifoveata, stria suturali integra, juxta suturam, basi, punctis aliquot in seriem dispositis, sulco dorsali basi valido ante medium abbreviato. Abdomen elytris subæquale, subconvexum.

♂. Trochanteribus anticis apice subrotundato-dilatatis, femoribus anticis, ante medium, spinula armatis; trochanteribus intermediis apice incrassatis; metasterno medio canaliculato. — ♀. Incognita.

Cette espèce, que ses antennes pourraient faire prendre pour le ♂ de la précédente, est bien réellement une espèce distincte. La tête est plus allongée, un peu rétrécie avant le sommet, ce qui fait paraître plus évident le tubercule antennaire divisé en deux par un sillon. Le corselet est bien plus étranglé en avant avec les côtés droits ; les élytres sont plus longues, avec les épaules obliques et marquées ; la teinte générale est plus foncée, les poils plus courts et bruns.

Un exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringuay.