

tête plus forte, plus nettement en fer à cheval, et le tubercule antennifer sans sillon. Les strioles sont bien moins fortes sur les élytres et manquent totalement sur l'abdomen ; enfin les trochanters intermédiaires chez les ♂ ne présentent qu'une très petite dent obtuse, tandis que chez *formicetorum*, cette dent est presque triangulaire et très pointue.

Les deux seuls individus que je connaisse m'ont été donnés par M. Lewis comme provenant des chasses du Dr Millingen, au Taïf, montagnes du Hedjaz (Arabie).

Tyraphus Sharpi n. sp.

Pl. I, fig. 5, 6.

Long., 1 1/2 mill. — Parum depresso, elongatus, antice attenuatus, rubro-ferrugineus, levis, nitidissimus ; pilis aliquot brevibus ; palpis pedibusque fulvostaceis ; capite et antennis minutissime punctatis. Caput subogivale, tuberculo antennario elongato, apice ampliato, longitudinaliter valde sulcato, hoc sulco juxta oculos in frontis fovea magna desinenti, vertice elevato, quasi bipartito et utrinque foveolam inuta. Oculi magni. Palpi validi, articulis 1° elongato, cylindrico, 2° primo longiori et apice duplo latiori, obconico, basi leviter sinuato, 3° subtriangulari, 4° præcedenti vix duplo longiori, plus duplo latiori, securiformi, apice rotundato-truncato. Antennæ crassæ, capiti thoracique longitudine subæquales, pubescentes ; articulis 1° magno, valido, 2° latitudine subæquali sed plus dimidio breviori, 3-6 minoribus, 3° obconico, 4-6 moniliformibus, sub-transversis, 7-8 paulo majoribus, transversis, 9-10 magnis, transversis, ultimo ovato, leviter acuminato. Thorax capiti cum oculis latitudine subæqualis, longior, subcordatus, antice plus, postice minus attenuatus, latitudine maxima ante medium, disco subconvexus, lateribus ad medium subcarinatus, utrinque foveolatus, et obsolete longitudinaliter subsulcatus, obsoletissime basi oblique impressus et medio foveolatus, basi tota minutissime dense granuloso-punctata. Elytra fere sesqui longiora, multo latiora, basi attenuata, humeris obliquis bene indicatis, basi foveis duabus ; striis suturali et dorsali integris, subcarinatis, dorsali leviter incurva ; margine apicali dense ochraceo-squamoso-piloso. Abdomen elytris latitudine et longitudine vix æquale, apice subtriangulare, segmento 1° superiori magno. Pedes breves, crassi, magis pilosi, femoribus et tibiis leviter medio incrassatis.

C'est au *Tyraphus (Tychus) Howitti* King que cette espèce ressemble le plus ; elle en diffère par sa forme plus aplatie, les an-