

**Bryaxis diversa n. sp.**

Long., 1 2/5-1 2/3 mill. — Brevis, sat crassa, picea, elytrorum disco dilutiori; antennarum articulis ultimis nigricantibus, pedibus palpisque rufis, pube brevissima, albida, parum dense vestita. Caput subquadratum, trifoveatum, fovea anteriori majori. Antennae breves, sat crassae, valde clavatae, articulis 1<sup>o</sup> majori, 2<sup>o</sup> subquadrato, elongato, 3<sup>o</sup> longiori, subconico, 4-6 subovatis, 7-10 subquadratis vel transversis, 8<sup>o</sup> cæteris minori, ultimo magno, obovato, acuminato. Thorax capite longior, haud lator, antice valde, postice vix attenuatus, basi obliqua, fovea media minutissima, lateralibus majoribus, supra latus sitis. Elytra antice paulo attenuata, humeris bene indicatis, stria dorsali fere integra, leviter incurva. Abdominis segmento 1<sup>o</sup> magno, striis duabus brevibus, divergentibus, plus quartam partem segmenti includentibus, et area inter strias paulo depressa. Tibiis posticis incurvis, intermediis leviter sinuatis.

♂. Antennae crassiores, magis clavatae, articulis 7-9 transversis, intus leviter productis, 10<sup>o</sup> multo majori, subquadrato, intus leviter producto, ultimo magno, obovato, intus basi dente obtuso praedito; tibiis anticis crassis, medio intus emarginatis, intermediis crassioribus et magis sinuatis, apice minutissime calcaratis; trochanteribus anticis spinula brevi armatis.

Var.? ♀. Minor, dilutior, elytris distincte punctulatis, tibiis intermediis magis sinuatis.

Cette variété pourrait bien être une espèce distincte; mais il est impossible d'en juger sur un individu unique, surtout ♀, les ♂ dans beaucoup de *Bryaxis* présentant seuls des caractères nettement différenciels.

Autant que j'en puis juger par la description et la figure, cette espèce ressemble à la *pulvinata* Reitt.; les antennes du moins ont beaucoup d'analogie, il y a aussi une similitude dans la pubescence, mais elle est moins épaisse certainement dans notre espèce qui n'est pas opaque. Les stries abdominales sont plus rapprochées et divergentes dans *diversa*; enfin cette dernière est d'une couleur foncée, tandis que la *pulvinata* Reitt. est *dilute testacea*.

Quelques exemplaires du Cap m'ont été communiqués par M. Perringuey.

**Bryaxis crassipes n. sp.**

Long., 1 5/6 mill. — Nigropicea, elytris rubris, cum sutura et apice infuscatis, antennis pedibusque brunneis, tarsis palpisque rufis,