

nitida, lœvis, pube brevissima, albida parcissime vestita. Caput subquadratum, trifoveatum, fovea anteriori magna, cæteris juxta oculos sitis, minutis; tuberculo parvo supra antennarum insertionem summo rufo. Antennæ graciles, parum clavatæ, articulis 1-2 majoribus, 3-6 oblongis, 7^o præcedenti breviori, 8^o subquadrato, minuto, 9^o subquadrato, majori, 10^o breviter obconico, majori, 11^o magno, oblongo, apice attenuato. Thorax capite major, antice valde, postice vix attenuatus, convexus, basi obliquus, trifoveatus, fovea media minuta, suboblonga, lateralibus majoribus, supra latera sitis; juxta basim utrinque punctis aliquot. Elytra thorace multo majora, subconvexa, humeris notatis, vix perspicue parce punctulata, stria discoidali fere integra, paulo ante apicem abbreviata, bisinuata. Abdominis segmento primo magno, basi vix perspicue bistratiulo, striolis brevissimis, leviter divergentibus, quartam partem segmenti includentibus. Metasternum depresso. Pedes validi, leviter incrassati, tibiis posticis leviter incurvis.

♂. Femoribus crassioribus, tibiis posticis magis incurvis, intermedii apice calcare valido et apice truncato præditis, anticis intus bisinuatis, medio et antice leviter dilatatis. Metasternum valde depresso. Abdomen infra trifoveatum, una fovea permagna, profunda, oblonga, in segmentis quarto, tertio et secundi apice extensa, altera transversa, minuta in sexti basi, tertiaque subtransversa, lata, parum profunda in sexti apice.

Cette espèce, remarquable par sa coloration et les pattes du ♂, m'a été communiquée par M. Peringuey. Elle provient du Cap.

Globa nov. gen.

Corpus breve, convexum, subglobosum. Caput magnum, subquadratum; antennæ valde distantes, 11-articulatæ, elongatæ, apice clava magna. Palpi maxillares sicut in Gen. *Bryaxis*. Thorax subcordatus. Elytra maxima, convexa, minutissime unistriata. Abdomen breve, valde declive, lateribus immarginatum, segmentis sex infra valde conspicuis instructum. Coxæ intermediæ leviter distantes, metasternum paulo elevatum, coxæ posticæ maxime distantes, trochanteres triangulares, haud elongati. Pedes graciles, elongati, tarsorum articulis 1^o minutissimo, 2^o magno, 3^o cylindrico, præcedenti leviter breviori, uniunguiculatis.

Ce genre est encore un des dérivés des *Bryaxis*; il ressemble surtout aux *Eupines*, mais il est encore beaucoup plus court, presque sphérique; l'abdomen est composé en dessous de 6 segments très-