

distincts, dont le premier est grand ; les segments supérieurs sont presque superposés et les derniers sont entaillés et cornus, ce qui n'est peut-être qu'un caractère sexuel.

Globa longipes n. sp.

Pl. II, fig. 2, 3.

Long., 1 1/4 mill. — Brevis, subglobosa, rubroferruginea, nitidisima, laevis et glabra, palpis testaceis. Caput magnum, subquadratum, fronte subdeplanata, antice utrinque juxta antennarum insertionem obsolete tuberculata et inter antennas leviter depressa, antice recte truncato, vertice juxta oculos obsolete et minute bifoveolato. Antennæ breviter et parce pilosæ, thoracis basim superantes, articulis 1° magno, subquadrato, 2° magno, ovato, 3-8 minoribus, primis brevissime suboblongis, cæteris fere subquadratis, 9-10 magnitudine crescentibus, trapezoidalibus, 11° oblongo, præcedentibus simul sumptis longiori, præcedenti vix latiori, basi truncato, apice acuminato. Thorax subcordatus, convexus, capite multo longior et paulo latior, antice plus, postice minus attenuatus, latitudine maxima ante medium, basi leviter bisinuata, absque sulcis et foveis. Elytra thorace plus sesqui longiora et fere duplo latiora, basi subquadrata, humeris bene indicatis, lateribus rotundata, apice leviter arcuata, valde convexa, stria suturali obsolete, integra, dorsali et foveis duabus basalibus deficientibus. Abdomen declive, supra vix conspicuum, segmentis supernis primo (apparenti) magno, 2° dimidio breviori, apice leviter sinuato, 3° late diviso, medio occulto, utrinque in lobo magno, oblongo, subdeplanato producto, 4° minuto, sub tertium abscondito, 5° magno, apice in dente magno, supra recurvo, apice triangulato, longe producto, infra segmentis 1° majori, 2-5 brevissimis, ultimo curvatim subtriangulari. Pedes elongati, graciles, tibis anticis et intermediis rectis, posticis leviter, post medium, incurvis, trochanteribus anticis nonnihil obtuse dilatatis.

Quand on regarde cet insecte en dessus, on ne voit de l'abdomen que les deux lobes latéraux du 4^e segment et la corne recourbée du 6^e qui vient se loger entre ces deux lobes ; le reste est caché par les élytres ; l'extrémité de la corne du dernier segment est tronquée obliquement et forme une plaque triangulaire ressemblant à un fer de lance ; quant au premier segment supérieur, il est très petit et caché complètement sous les élytres, on en aperçoit cependant la trace de chaque côté du sommet des élytres ; le 5^e segment est très