

♀. Trochanteribus simplicibus, segmento ultimo ventrali cornu leviter recurvo, obtuso, ultimo dorsali tuberculo obtuso et compresso munitis.

Cette espèce est très voisine de la *majorina*; elle en diffère par sa forme plus étroite, sa couleur plus claire, la forme du 3^e article des antennes, le sillon longitudinal très-visible du disque du thorax. Je ne puis comparer les ♂, celui de la *majorina* m'étant inconnu; mais chez la ♀ de *pallidula*, la corne du dernier segment ventral est plus allongée, et un peu relevée, le tubercule du dernier segment dorsal est comprimé transversalement.

Plusieurs exemplaires du Cap.— Racines d'un pin mort, octobre ; M. Peringuery.

Raffrayia longula n. sp.

Long., 2 1/3 mill. — Elongata, parallela, rubro-ferruginea, nitida, breviter parce flavopilosa; antennis, palpis pedibusque rufis. Caput vix punctatum, subelongatum, antice leviter attenuatum, post oculos utrinque minute foveatum et sulcatum, sulcis obsoletis antice junc- tis, fronte depressa, vertice usque ad collum carinato. Antennæ minus crasse, magis elongatæ, articulo 3^o suboblongo, precedenti et præsertim sequenti longiori. Thorax valde cordatus, capite latior, lateribus rotundato-dilatatus, post medium late utrinque foveatus et juxta foveas abrupte et valde emarginatus, dein basim versus late- ribus sinuatus, medio ante basim fovea oblonga, cum foveis latera- libus sulco accentiformi juncta; in basi utrinque foveola minuta; disco convexus, haud sulcatus. Elytra elongata, thorace fere duplo longiora, vix latiora, lateribus parallela, humeris prominulis sed vix distinete dentatis, remote evidenter punctata, basi valde bifoveata, stria dorsali medio abbreviata. Abdomen elytris brevius, lateribus leviter rotundatum, segmento primo cæteris longiori, basi striolis duabus divergentibus.

♂. Trochanteribus intermediis basi dente brevi, posticis apice spinula brevi, leviter sinuata, armatis, tibiis intermediis breviter calcaratis. Abdominis infra segmentis 2, 3, 4 late depresso, 3-4 utrinque mucronatis, 6^o medio depresso et apice sinuato.

♀. Ignota.

Cette espèce se distingue de ses congénères par sa forme allongée, parallèle; elle est voisine de la *pallidula*, mais sa coloration est plus foncée, sa ponctuation beaucoup moins forte; les fossettes et sillons céphaliques sont beaucoup moins accentués que dans les autres es- pèces, les épaules enfin sont à peine distinctement dentées.