

le groupe des *Trichonyx*, mais il y prend une place à part, rappelant plutôt par son facies les *Trimium* et *Trimiopsis*.

Chætorhopalus unicolor n. sp.

Pl. II, fig. 8, 9, 10.

Long., 3/4 mill. — Oblongus, testaceorufus, lœvis, nitidus, parce breviter albido-pilosus ; pedibus, palpis antennisque testaceis. Caput subtriangularis, transversum, subdeplanatum, antice transversim impressum, in vertice foveolis duabus. Oculi magni. Antennæ capite plus duplo longiores, in basi parce, in clava longius et densius pilosæ ; articulis duobus primis magnis, subæqualibus, 1^o subgloboso, 2^o subquadrato, 3-8 plus duplo minoribus, 3^o valde transverso, 7^o cæteris nonnihil longiori, 9^o latiori, subtransverso, 10^o latiori, transverso, ultimo tribus præcedentibus simul sumptis longitudine subæquali, obovato, apice leviter acuminato. Thorax subovatus, capite latior et fere duplo longior, subconvexus, lateribus rotundatus, postice plus, antice minus attenuatus, juxta basim utrinque ad latera foveola obliqua vix perspicua et basi ipsa leviter depressa et fere sulcata. Elytra thorace latiora et plus sesqui longiora, lateribus subrotundata et medio latitudine maxima, apice subrecte truncata, subconvexa, humeris fere nullis, obliquis, basi bifoveolata, fovea dorsali majori oblonga, stria suturali integra, dorsali ante medium abbreviata. Abdomen elytris minus elatum et brevius, segmento 1^o (aparenti) sequentibus plus duplo longiori, basi obsolete et breviter bistratiulo. Femoribus anticis et præsertim intermediis medio incrassatis, tibiis omnibus reclusis, medio leviter incrassatis.

♂. Abdomen segmentis 7 instructum, ultimo ogivali, medio depressione ovali et longitudinali notato ; trochanteribus intermediis medio, et præsertim posticis basi, subangulatim leviter dilatatis ; femoribus intermediis subtus ante medium dentatis, medio emarginatis et apice canaliculatis, supra post medium inflatis, tibiis omnibus apice muticis.

♀. Abdomen segmentis 6 instructum, ultimo triangulari, convexo ; trochanteribus omnibus simplicibus, femoribus intermediis infra inermibus, supra minus incrassatis.

Quelques exemplaires en fauchant au coucher du soleil, dans les prairies humides, autour de la ville de Zanzibar.