

**Periplectus n. g.**

Affinis Gen. *Trimio*. Caput thorace brevius. Antennæ breves, articulis intermediis moniliformibus, ultimo multo majori. Palpi breves, articulis 2° apice clavato, 3° subtransverso, ultimo multo majori, subovato, apice obtuso. Abdomen segmentis sex instructum, 1° (apparenti) dorsali et ventrali cæteris longiori. Coxæ posticæ approximatæ. Tarsi uniunguiculati.

Ce genre ressemble beaucoup aux *Trimium* et encore plus aux *Trimiopsis*; il diffère des deux par le dernier article des antennes beaucoup moins gros, par le dernier article des palpes plus fort, plus obtus au sommet, et les dimensions relatives des segments abdominaux.

**Periplectus nigripennis n. sp.**

Pl. II, fig. 16, 17.

Long., 4/5 mill. — Parum elongatus, subeylindricus, testaceo rufus, elytris nigro piceis, pedibus testaceis, sparsim sat longe albido setosüs, hinc et inde pilis aliquot longioribus albidis. Caput subtriangulare, trifoveatum, fovea anteriori majori, foveis tribus sulco semicirculari junctis, vertice elevato, transverso, medio leviter sulcato. Antennæ breves, alhopilosæ, articulis 1-2 majoribus, 3-8 moniliformibus, subtransversis, magnitudine crescentibus, 9-10 transversis, 10° majori, ultimo magno, breviter ovato, intus apice sinuato, nigro. Thorax subcordatus, subconvexus, basi trifoveatus, foveis sulco valido circumflexo junctis. Elytra thorace vix longiora sed multo latiora, lateribus leviter subrotundata, basi trifoveata, stria suturali integra et sulco discoïdali medio abbreviato, humeris subelevatis. Abdomen elytris vix longius, segmento 2° (primo apparenti) cæteris non multo majori.

♂. Abdominis segmento ultimo ventrali foveola ovali, longitudinali munito et apice sinuato; tibiis intermediis spina minuta apice munitis.

♀. Abdominis segmento ultimo ventrali triangulari, simplici.

Très abondant, en fauchant le soir, dans les prairies marécageuses; environs de Zanzibar.