

*Scolopax (bicolor).* *Petite Bécassine de Mer.*

Super subolivaceo-grisea; subtus sordide alba, alis tamen caudaque partim griseis: rostro, capite sesqui-longiore, pedibus luteis.

Passerines.

*Columba (rufaxilla)* supra tota griseo-fusca; abdomine subalbido; tectricibus inferioribus alarum saturate ferrugineis: rectricibus infimis apice albis.

*Turdus ( . . . )* affinis *T. senegalensi*. Linn. ed. Gmel. pag. 823.

*Loxia (semitorquata)* supra griseo-nigricans; capite, rectricibusque nigris: alis griseo-marginatis et albo-submaculatis: subtus griseo-albidus; torque concolore incompleto.

*Tanagra ( . . . )* *Tangara de la Guyane.* Buff. enlum. 742. (Actes etc. no. 86.)

*Tanagra ( . . . )* *Tangara pourpré de Cayenne.* Buff. enlum. 128. fig. 1. (Actes etc. no. 93.)

*Tanagra ( . . . )* *Femelle du Tangara pourpré de Cayenne.* Buff. enlum. 128. fig. 2. (Actes etc. no. 94.)

*Tanagra ( . . . )* *Tangara à tête rousse de Cayenne.* Buff. enlum. 290. fig. 1. (Actes etc. no. 95.)

*Fringilla ( . . . )* affinis *Fringillae domesticae*. Linn. edit. Gmel. pag. 925. (Actes etc. no. 96.)

I N S E C T A \*).

Eleuterata.

*Scarabaeus [clavatus]* scutellatus muticus piceus, clava antennarum majori elongata.

Magnitudo *Scar. Philocet. Oliv.*

*Helops Nigrita* Fabr.?

*Tenebrione molitore* duplo major. Corpus supra atrum, subtus piceum. Thorax subquadratus. Elytra striata, striis punctatis.

*Helops [aeneus]* niger, elytris nigro-aeneis, violaceo-nitentibus.

*Erotylus [marginatus]* flavescens, elytris nigro-violaceis, flavo marginatis.

Melo-

\* Beschrieben von Herrn Olivier.