

Matériel étudié (quelques ouvrières et une femelle); Kankarak (A 431), Sorkhab, alt. 850 m, à l'ouest de Djelalabad, pentes pierreuses, sous la pierre; Chah Mard Khan (A 446), près de Djelalabad, alt. 590 m, sous la pierre, près d'un karez.

*Messor aralocaspicus* (RUZSKY, 1902)

*Aphenogaster barbara* v. *aralocaspia* RUZSKY, 1902a: 20–21.

RUZSKY, 1905a: 728, 745–746; EMERY, 1908a: 449; KARAWAJEW, 1909a: 62–64, fig. 30–31; EMERY, 1921: 71–72; RUZSKY, 1923: 4; KUZNETZOV-UGAMSKIJ, 1927b: 90; SANTSCHI, 1927b: 239–240, 249; KUZNETZOV-UGAMSKIJ, 1929a: 5, 16–17, carte.

Espèce répandue dans le plateau de Touran et au pied de l'Hindoukouch et de Tian-chan, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (nombreuses ouvrières, quelques femelles et mâles): Bhougavi (A 377), entre Sar-Pol et Sang-toda, pentes steppiques, sous la pierre; Angout (A 378) près Bhougavi; Qaïsar (A 406), entre Ghourmatch et Maïmaneh; Bozbal (A 376), entre Ghourmatch et Bala-Morghab, alt. 600 m; Qal'éh No (A 385); Dahlah (A 484), à 22 km au nord de Qandahar, alt. 1050 m.

*Messor meridionalis meridionalis* (ANDRÉ, 1882)

*Aphenogaster barbara* v. *meridionalis* ANDRÉ, 1882: 355.

EMERY, 1921: 71 (synonymie et répandu); SANTSCHI, 1927b: 230, 248, fig. 1; COLLINGWOOD, 1961a: 54, 60; COLLINGWOOD, 1961b: 289.

Sous-espèce répandue de la péninsule balcanique jusqu'à l'Asie Centrale.

Matériel étudié (nombreuses ouvrières, quelques femelles et mâles): Tang Sayed (A 362), entre Aïbak et Tachqourghan, environ 60 km au sud-ouest de Mazar-Chérif, alt. 450 m; Sang-Toda (A 378), au sud de Sar-Pol, alt. 810 m; Andkhoi (A 380); Bozbal (A 376, 381) à l'est de Bala Morghab, alt. 600 m; Darréh-Boum (A 373), entre Bala Morghab et Qal'éh Naou, alt. 610 m; Soumi (A 300), 12 km à l'ouest de Khvadjeh Tchiht, alt. 1520 m; Qalat (A 307), alt. 1162 m; Douzach Emam (A 271), près de Paghman, alt. 2260 m, 1 ♂.

*Messor meridionalis infumatus* KUZNETZOV-UGAMSKIJ, 1927

*Messor barbarus meridionalis* v. *infumatus* KUZNETZOV-UGAMSKIJ, 1927b: 91; 1929a: 6, 19–21, fig. 14, carte.

Sous-espèce connue de plusieurs localités entre les rivières Syr Daria et Ili, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (1 ouvrière): Mazar-Chérif (A 404), steppe, sous la pierre.

*Messor reticuliventris* KARAWAJEW, 1909

*Messor barbarus reticuliventris* KARAWAJEW, 1909a: 67–78, fig. 33.

EMERY, 1921: 71; KUZNETZOV-UGAMSKIJ, 1927a: 89; 1929a: 5, 16, 24; COLLINGWOOD, 1961a: 53, 60–61.