

Genre: *Camponotus* MAYR*Camponotus buddhae* FOREL, 1892

FOREL, 1892a: 227–238; BINGHAM, 1903: 349, 359–360; Ruzsky, 1905b: 187, 190–191; EMERY, 1908a: 204; KARAWAJEW, 1912: 592; VIEHMEYER, 1916: 290, fig. 2; STÄRCKE, 1935: 264; MENOZZI, 1939: 315, 318; EIDMANN, 1942: 144, 251; MANI, SINGH, 1962: 84.
Camponotus fedtschenkoi MAYR: COLLINGWOOD, 1961a (partim): 54, 77 fig. 24.

Espèce répandue dans les montagnes d'Asie Centrale: Himalaya d'ouest, Cachemire, Pamir et Hindoukouch d'est, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (quelques ouvrières, une femelle et un mâle): Dival Kol (A 501), entre Kaboul et Pandjao; Cheikhabad (A 473), au sud de Kaboul, route de Ghazni, alt. 2050 m; Tchidjan (A 452) près de Cheikhabad, alt. 2050 m.

Camponotus obliquipilosa Ruzsky, 1905, stat. nov.

Camponotus maculatus fedtschenkoi v. *obliquipilosa* Ruzsky, 1905a: 197; KARAWAJEW, 1909b: 268; EMERY, 1925a: 93.

Camponotus fedtschenkoi MAYR: COLLINGWOOD, 1961a (partim): 54, 77, fig. 22.

Espèce connue de Kopet-Dag et dans la vallée de Ferghana, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (quinzaine d'ouvrières, une femelle et un mâle): Djiroudj (A 870), au bord du lac Koul-Chogh-nam, alt. 3100 m; Bend Amir (A 342); Kachm (A 732), entre Talaquan et Faizabad, à environ 80 km au sud-ouest de Faizabad, alt. 1020 m; Doab (A 357), alt. 1450 m; Col de Chotor Khoum (A 294), entre Qual'éh Ahangueran et Qual'éh Chahrak, à environ 260 km à l'est de Hérat, alt. 3200 m; Qual'éh Dahon-Tchakka (A 299), à l'ouest de Lal, Hezaradjat; Beltschiragh (A 638), au sud-est de Maïmanéh, alt. 1120 m; Qual'éh No (A 385); Darreh-Zang (A 767), Régin de Beltchiragh, alt. 1500 m

Camponotus turkestanicus EMERY, 1887

Camponotus sylvaticus turkestanicus EMERY, 1887: 212.

Ruzsky, 1905a: 187, 202–204; EMERY, 1908a: 191, 203; KARAWAJEW, 1909a: 11, 12, fig. 2; EMERY, 1920: 6, 12; 1925a: 95; COLLINGWOOD, 1961a: 54, 74; 1961b: 289.

Camponotus sylvaticus var. *d* MAYR, 1877: 2.

Camponotus maculatus kaschgariensis FOREL, 1901: 67.

L'espèce répandue de la mer Caspienne jusqu'au Pamir.

Matériel étudié (quelques ouvrières): Douchi (A 465), 140 km au nord de Kaboul, alt. 700 m.

Camponotus bactrianus sp. n.

Ouvrière. Long. 5,0–14,0 mm.

Ouvrière maior. Tête brune foncée, rougeâtre, front et vertex noirâtres. Scapes des antennes bruns, au milieu noirs, funicules fauves. Dos du thorax