

*Cataglyphis foreli bucharica* (FOREL, 1904)

*Myrmecocystus altisquamis foreli* v. *bucharica* FOREL, 1904: 293.

RUZSKY, 1905a: 439; EMERY, 1925a: 264; SANTSCHI, 1929: 54, 60; ARNOLDI, 1964: 1811-1918, fig. 10.

L'espèce signalée des environs de Boukhara, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (quelques ouvrières): Asiabad (A 359), entre Aïbak et Tach-quourghan, environ 70 km au sud-est de Mazar-Chérif, alt. 820 m.

Les ouvrières de l'Asiabad sont plus claires que les typiques, elles ont le thorax rouge-testacé.

*Cataglyphis cinnamomea* (KARAWAJEW, 1909) stat. nov.

*Myrmecocystus albicans viaticoides* v. *cinnamomea* KARAWAJEW, 1909a: 37-38, fig. 14; KARAWAJEW, 1909b: 269; EMERY, 1925a: 263; SANTSCHI, 1929: 55-61.

*Cataglyphis albicans* ROG.: MAYR, 1877: 9

*Myrmecocystus albicans* (ROG.): RUZSKY, 1905a: 440-442.

Espèce répandue dans les terrains désertiques, entre la mer Caspienne et les montagnes Tian-chan, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (quelques ouvrières): Asiabad (A 359) entre Aïbak et Tach-quourghan, environ 70 km au sud-est de Mazar-Chérif, alt. 820 m; Pol-Khomri (A 391), 150 km au nord de Kaboul, alt. 650 m; Tcharikaz (A 443), 60 km au nord de Kaboul, alt. 1725 m, leg. De Cou; Kouh Dana Ouât (A 497), près de Spin Boulaq, frontière du Pakistan, côté Tachman, alt. 1200 m.

*Cataglyphis livida lutea* (EMERY, 1906)

*Myrmecocystus albicans viaticoides* v. *lutea* EMERY, 1906: 179.

CRAWLEY, 1920: 177; EMERY, 1925a: 263; SANTSCHI, 1929: 55, 62.

*Myrmecocystus albicans livida* AND.: KARAWAJEW, 1912: 305-306.

La sous-espèce signalée de Perse et de l'Irak, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (quelques ouvrières): Jija (A 325), entre Hérat et Farah; Kouh Dana Ouât (A 497), près de spin Boulaq, frontière du Pakistan, côté Tachman, alt. 1200 m; Kouh-chiqui (A 439), Laghman, 45 km au nord-ouest de Djelalabad, alt. 1370 m.

*Cataglyphis setipes turcomanica* (EMERY, 1898)

*Myrmecocystus viaticus desertorum* v. *turcomanica* EMERY, 1898: 147.

RUZSKY, 1905a (partim): 430-436, fig. 83-85; EMERY, 1906: 184-185, fig. 31; KARAWAJEW, 1909a: (partim): 39-41, fig. 15; EMERY, 1925a: 266; SANTSCHI, 1929: 49, 56, fig. 36; ARNOLDI 1964: 1804-1805, fig. 4.

La sous-espèce répandue dans les déserts entre la mer Caspienne et les montagnes Tian-chan, nouvelle pour l'Afghanistan.

Matériel étudié (nombreuses ouvrières): Mir Daoud (A 329), au nord de Hérat; Tang-Kharzar (A 306), Hézaradjat, environ 180 km à l'est de Hérat;