

2. *Myrmica sulcinodis* NYL.

Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500–1800 m, 22.–23. VII. 1965, am Waldrand und in den Steppenwiesen (Nr. 298), 1 ♂. — Chentej aimak: zwischen Somon Zenchermandal und Somon Žargaltchaan, 10 km O von Zenchermandal, 1400 m, 27. VII. 1965, Bergsteppe mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 311), 1 ♂. Verbreitung: Nord-Europa und Nord-Asien.

3. *Myrmica angulinodis* RUZS.

Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500 m, 6. VII. 1964 (Nr. 271); 126 km N von Ulan-Baator, am Wege, 1100 m, 9. VII. 1964 (Nr. 288). — 7 ♂♂. Verbreitung: Ostsibirien.

4. *Myrmica forcipata* KARAW.

Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500–1800 m, 22.–23. VII. 1965 (Nr. 297a, 298); Nucht im Bogdo ul, 1880–2000 m, 9. VI. 1966 (Nr. 508); SO Somon Bajanzogt, 1600 m, 11. VI. 1966 (Nr. 520). — 27 ♂♂.

Verbreitung: Jakutien.

5. *Myrmica kasczenkoi* RUZS.

Central aimak: 26 km O von Somon Lun, 1180 m, 3. VII. 1964, Artemisia-Steppe (Nr. 259); Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1800 m, 23. VII. 1965, am Waldrand von Nadelholz und Salix-Gebüsch (Nr. 300); Lager am Fluß Kerulen, 45 km O von Somon Bajandelger, 1400 m, 26. VII. 1965 (Nr. 304); SO von Somon Bajanzogt, 1600 m, 11. VI. und 27. VII. 1966 (Nr. 520 und 750). — Chentej aimak: 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28. VII. 1965 (Nr. 323). — Archangaj aimak: Changaj Gebirge, zwischen Somon Ichtamir und Somon Čuluut, ca. 20 km W von Somon Ichtamir, 3 km S vom Tal des Flusses Chanuj gol, 2150 m, 19. VI. 1966, typische Hochgebirgssteppe mit Nadelwäldern und im Tal mit sehr üppiger Vegetation, blühende Trollius-Wiesen (Nr. 544). — Bajanchongor aimak: Changaj Gebirge, Ulaan čolon, 18 km S von dem Paß Egijn davaa, 2300 m, 20. VI. 1966, im Tal neben dem Bach, an einer steinigen, kahlen Bergsteppe (Nr. 552). — 20 ♂♂, 3 ♀♀.

Verbreitung: Ostsibirien.

6. *Myrmica saposchnikovi* RUZS.

Central aimak: Lager am Fluß Kerulen, 45 km O von Somon Bajandelger, 1400 m, 26. VII. 1965 (Nr. 304); SO von Somon Bajanzogt, 1600 m, an südlich exponierter Bergsteppe, 11. VI. und 27. VII. 1966 (Nr. 520b und 750). — Chentej aimak: zwischen Somon Zenchermandal und Somon Žargaltchaan, 10 km von Zenchermandal, 1400 m, 27. VII. 1965, Bergsteppe mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 311 und 312); Čandagan tal, 40 km O von Žargaltchaan, 1300 m, 28. VII. 1965, Federgras-Steppe (Nr. 316); 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28.–29. VII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe (Nr. 319 und 323); 150 km ONO von Öndörchaan, 10 km S vom Fluß Kerulen und 10 km N von Somon Tumunzogt, 1000 m, 30. VII. 1965, Gebirgs-Steppe mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 331); Somon Tumunzogt, 160 km ONO von Öndörchaan, 1000 m, 31. VII. 1965, Gebirgssteppe, Versuchspartellen im Dorf (Nr. 338);