



Fig. 5–10. *Leptothorax servicus mongolicus* ssp. n. (5–8: Holotypus)

5: Kopf – 6: Fühler – 7: Thorax von der Seite – 8: Thorax von oben – 9: Thorax von der Seite, Paratypus, Mongolei, Bulgan aimak, 5 km O von Somon Abzaga (Nr. 251) – 10: Thorax von der Seite, Paratypus, Mongolei, Uburchangaj aimak, Changaj Gebirge, 18 km S von Somon Chužirt (Nr. 323)

Paratypen: 2 ♂♂ vom selben Nest wie der Holotypus; Mongolei, Uburchangaj aimak, Changaj Gebirge, 18 km S von Somon Chužirt, 1830 m, 29. VI. 1964. Hochgebirgs-Wiese mit Blumen, leg. Z. KASZAB (Nr. 223), 4 ♀♀; Mongolei, Central aimak, Lager am Fluß Kerulen, 45 km O von Somon Bajandelger, 1340 m, 26. VII. 1965, am kieseligen Flußufer mit Wasser ausgeschwemmt, leg. Z. KASZAB (Nr. 304), 3 ♀♀; Mongolei, Suchebaator aimak, 44 km SSW von Baruun urt, 1050 m, 2. VIII. 1965, trockene Gebirgssteppe, in einem tiefen Wasserriß mit Ulmus-Bäumen und Sorbus-Gebüsch, an den Anhängen mit Federgras, an den flachen Stellen mit Artemisia, leg. Z. KASZAB (Nr. 349), 1 ♀; Mongolei, Čojbalsan aimak, 80 km NW von Čojbalsan, 700 m, 17. VIII. 1965, zwischen Hügeln, blumenreiche Wiese mit Galium, Scabiosa, Aster, etc., leg. Z. KASZAB (Nr. 431), 1 ♀; Mongolei, Central aimak, SO von Somon Bajanzogt, 1600 m, 11. VI. 1966, am alten Lagerplatz, neben dem Birkenwald, leg. Z. KASZAB (Nr. 519), 1 ♀; Mongolei, Archangaj aimak, Changaj Gebirge, 8 km W von Somon Ūrdtamir, 1620 m, 18. VI. 1966, an der trockenen Bergsteppe und in einem Wasserriß, leg. Z. KASZAB (Nr. 538), 1 ♀; Mongolei, Bulgan aimak, 5 km O von Somon Abzaga, 1400 m, 2. VII. 1964, steile Bergseite, in den sich nach Norden öffnenden Tälern üppige Vegetation, Steppe mit Blumen (Nr. 252), 1 ♀.