



Fig. 15–17. *Leptothorax kaszabi* sp. n., Weibchen, Paratypus
 15: Kopf — 16: Epinotum von der Seite — 17: Thorax von oben

Archangaj aimak: Changaј Gebirge, 8 km W von Somon Urdtamir, 1620 m, 21. VII. 1966, an den blumenreichen Gebirgssteppen (Nr. 724). — 15 ♀♀, 1 ♂.

Verbreitung: Ostsibirien (Umgebung von Wladiwostok).

14. *Harpagoxenus zaisanicus* PISARSKI

Chovd aimak: 10 km SSW von Somon Bulgan, 1200 m, 4.–5. VII. 1966, in der Nähe eines linken Nebenarmes des Flusses Bulgan gol, neben großen Sandhügeln, welche mit *Tamariscus*, *Saxaul* und *Ephedra* gebunden sind, in einem großen, abflußlosen, salzigen Becken, am Rand mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 628), 1 ♂.

Verbreitung: Nordmongolei (Zaisan im Bogdo ul).

15. *Tetramorium jacoti* WHEELER

Chovd aimak: 3 km N von Somon Uenč, im Tal des Flusses Uenč gol, 1450 m, 2.–3. VII. 1966, am Flußufer, von der steinigen, sandigen und grasigen Stelle (Nr. 619); 10 km SSW von Somon Bulgan, 1200 m, 4.–5. VII. 1966, in der Nähe eines linken Nebenarmes des Flusses Bulgan gol, neben großen Sandhügeln, welche mit Tama-