

Baator, am linken Ufer des Tola, 1300–1400 m, 11. VI. 1964, von blühenden Sträuchern und von niedriger Vegetation (Nr. 117); Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500–1800 m, Tal mit einem Bach, zweiseitig mit steilen Berghängen, an der nördlichen Seite Nadelwald, neben dem Bach mit Birkenbäumen, die Südseite ist eine trockene, steinige Steppe (Nr. 295, 297a, 297b, 298, 486, 495, 507, 508; 118, 122, 272, 273, 514); Ulan-Baator, Zaisan im Bogdo ul, 1600 m, 6. VI. 1966, am Talgrund vom Gesträuch (Nr. 499); 12 km W von Somon Lun, 1300 m, 3. VII. 1964, steile Bergseiten, in den nach Norden laufenden Tälern und Wasserrissen eine sehr reiche Vegetation, Wildmandel, Caragana, blühendes Galium usw. (Nr. 258); Ubulan am Fluß Tola, 60 km O von Ulan-Baator, 1370 m, 25. VIII. 1965, Überschwemmungsgebiet des Flusses Tola, im Auwald (Nr. 481, 482, 484); Terež, ca. 80 km ONO von Ulan-Baator, 1530 m, 2. VI. 1966, am rechten Ufer des Tola, unter Steinen und trockenem Mist im Galeriewald des Überschwemmungsgebietes (Nr. 492); ca. 30 km O von Somon Nalajch, 1530 m, 14. VI. 1966, am feuchten Talgrund sowie an den trockeneren, kahlen Berghängen bis zum Waldrand (Nr. 523); Tal des Flusses Tola, zwischen Somon Altanbulag und Somon Tariat, ca. 30 km ONO von Somon Tariat, 1200 m, 24. VII. 1966, Caragana-Steppe an einem Berghang mit Sandboden (Nr. 743). — Č o j b a l s a n a i m a k : 20 km SW von Somon Bajan-uul, 820 m, 18. VIII. 1965, neben dem am linken Ufer des Flusses Uls gol emporragenden Berge, Birkenwald-Steppe, blumenreiche, nasse Täler und trockene Wiesen an Berghängen (Nr. 444); 15 km N von Somon Galuut, 850 m, 17. VIII. 1965, breites Tal mit blumenreicher Wiese (Nr. 433). — A r c h a n g a j a i m a k : Changaj Gebirge, Zezerleg, 1650 m, 19. VI. 1966, in der Umgebung der Tankstelle, von der öden, jedoch blühenden Steppe (Nr. 542); Changaj Gebirge, 8 km W von Somon Urdtamir, 1620 m, 21. VII. 1966, von den blumenreichen Gebigssteppen (Nr. 724). — Weit über 200 ♂♂, 2 ♀♀ und 15 ♂♂.

Verbreitung: Südost-Sibirien, Nordchina.

21. *Camponotus turestanus* ANDRÉ

Südgobi aimak: 5 km O vom See Ulaan nur, 1010 m, 18. VI. 1964, sandige, lehmige Ebene, mit sehr wechselreicher Vegetation, Saxaul (*Haloxylon*), *Nitraria*, *Caragana*, *Lasiagrostis*, stellenweise einige sehr alte *Salix* usw. (Nr. 145). — G o b i A l t a j a i m a k : Scharyn Gobi, SO-Ecke, 1120 m, 23. VI. 1966, sandiges, lehmiges, schotteriges Flachland mit kleinen Sandhäufungen (Nr. 566); Tachijn Schar nuruu Gebirge, Tuchumin chundi, ca. 30 km NW vom Paß der Až Bogd ul, 2000 m, 30. VI. 1966 (Nr. 603). — 10 ♂♂.

Verbreitung: Zentralasien.

22. *Lasius* (s. str.) *niger* L.

Chovd aimak: 3 km N von Somon Uenč, im Tal des Flusses Uenč gol, 1450 m, 2.–3. VII. 1966, gekeschert am Talgrund neben dem Bach (Nr. 614, 619); am Fluß Bulgan gol, ca. 15 km N von Somon Bulgan, 1300 m, 7. VII. 1966, am Ufer geschwemmt (Nr. 640); Mongol Altaj Gebirge, ca. 35 km N von Somon Uenč, 1750 m, 8. VII. 1966, im Tal eines kleinen linken Nebenbaches vom Fluß Uenč gol, blumenreiche feuchte Wiese am Talgrund (Nr. 646); Mongol Altaj Gebirge, Tal des Flusses Uenč gol, ca. 44 km N von Somon Uenč, 1780 m, 8. VII. 1966, an der sehr üppigen Vegetation des Flußufers (Nr. 647). — 57 ♂♂.

Verbreitung: Holarktis.