

23. *Lasius (s. str.) alienus* FOERST.

Central aimak : Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1700 m, am steilen, kahlen, südlich gelegenen Berghang (Nr. 4), im Walde, auf der nördlichen Seite (Nr. 271), an der steinigen, öden Bergseite südlicher Exposition (Nr. 272), 1500–1800 m, am Waldrand und in den Steppenwiesen (Nr. 298), 1650–1950 m, unter Steinen (Nr. 495); Zuun-Chara, Kusin ul, 1450 m, 9. VII. 1963, felsige Berghänge mit üppigem Pflanzenwuchs, mit niedrigen Ulmus- und wilden Aprikosen-Sträuchern (Nr. 101); SO von Somon Bajanzogt, 1600 m, im Walde und im Tal von den Pflanzen (Nr. 264, 520a), von der üppigen Vegetation am Talgrund und am Waldrand (Nr. 749); Lager am Fluß Kerulen, 45 km O von Somon Bajandelger, 1340 m, 26. VII. 1965, vom kieseligen Flußufer (Nr. 303) und der sehr steinigen, öden, südlichen Bergsteppe (Nr. 304). — Chentej aimak : zwischen Somon Zenchermandal und Somon Žargaltchaan, 10 km O von Zenchermandal, 1400 m, 27. VII. 1965, Bergsteppe mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 311); 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28.–29. VII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, an den Hängen mit Amygdalus-Gebüsch (Nr. 319); 150 km ONO von Öndörchaan, 10 km S vom Fluß Kerulen und 10 km N von Somon Tumunzogt, 1000 m, 30. VII. 1965, Gebirgs-Steppe mit sehr üppiger Vegetation, breites Tal von niedrigen Bergen umgeben, nördlich vom Lager ein kleiner Waldfleck (Nr. 331); 20 km SW von Somon Batnorov, 1000 m, 20. VIII. 1965, trockene Steppe, flache Berge, breite Bergrücken (Nr. 454). — Suche baator aimak : Ongon elis, 10 km S von Somon Chongor, 900 m, 3.–5. VIII. 1965, Sandhügel mit Tamarix und Ulmus-Gebüsch, Amygdalus etc. (Nr. 355); 45 km N von Somon Erdenezagan, 900 m, 9. VIII. 1965, blumenreiche Steppe (Cirsium, Allium, Artemisia etc.) (Nr. 381). — Čojbalsan aimak : 15 km N von Somon Galuut, 850 m, 17. VIII. 1965, breites Tal mit blumenreicher Wiese (Nr. 433); 20 km SW von Somon Bajan-uul, 820 m, 18. VIII. 1965, neben dem am linken Ufer des Flusses Uls gol emporragenden Berge, Birkenwald-Steppe, blumenreiche, nasse Täler und trockene Wiesen an Berghängen (Nr. 444). — Archangaj aimak : Changaj Gebirge, 8 km W von Somon Urđtamir, 1620 m, 18. VI. 1966, in einem Nebental, auf blühender Bergsteppe (Nr. 538, 724). — Bulgan aimak : 5 km O von Somon Abzaga, 1400 m, 2. VII. 1964, steile Bergseite, in den sich nach dem Norden öffnenden Tälern üppige Vegetation, Steppe mit Blumen (Nr. 251); ca. 20 km W von Somon Bajannuur (220 km W von Ulan-Baator), 1100 m, 17. VI. 1966, Caragana-Steppe auf sandigem Boden (Nr. 531); 4 km S von Somon Daschinčilen, 1200 m, 23. VII. 1966, Caragana-Steppe am Sandboden, dazwischen mit Schotterboden (Thymus-, Lasiagrostis- und Urtica-Flecke) (Nr. 733, 735). — Uburchangaj aimak : Arc Bogd ul, ca. 20 km S von Somon Chovd, 1760 m, 21. VI. 1964, nach Norden sich öffnendes Tal, am Fuße außerordentlich steiniger Wasserriß, öde Vegetation, Caragana, wilde Mandel, Artemisia (Nr. 167). — Chovd aimak : Chovd, ca. 5 km SW von der Stadt, 1500 m, 10. VII. 1966, von kahlen, felsigen Bergen umgebenes Tal mit sandigem Schotter (Nr. 666). — Weit über 100 ♂♂, 12 ♀♀ und 10 ♂♂.

Verbreitung: Holarktis.

24. *Lasius (Chtonolasius) distinguendus* EM.

Central aimak : Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500–1800 m, 22. VII. 1965, Tal mit einem Bach, zweiseitig mit steilen Berghängen, an der nördlichen Seite Nadelwald, neben dem Bach mit Birkenbäumen, die Südseite ist eine trockene, stei-