

nige Steppe (Nr. 294 und 297): SO von Somon Bazanzogt, 1600 m, 11. VI. 1966, in dem Wald (Nr. 520a und 749). — 25 ♀♀, 2 ♀♀.

Verbreitung: Palaearktis.

#### 25. *Proformica buddhaensis* RUZS.

Central aimak: Borulčin tala, ca. 100 km SO von Ulan-Baator, 4. VII. 1963, breites Tal, ringsum hohe, felsige Berge, an den Berghängen verschiedenartiger Pflanzenwuchs (Nr. 90). — Bajanchongor aimak: Changaj Gebirge, 5 km O von Bajanchongor (neues Zentrum), 2000 m, 27. VI. 1964, Caragana-Steppe (Nr. 208). — Chentej aimak: zwischen Somon Zenchermandal und Somon Zargaltchaan, 10 km O von Zenchermandal, 1400 m, 27. VII. 1965, Bergsteppe mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 311). — Bulgan aimak: 9 km O von Somon Abzaga, 1300 m, 22. VII. 1966, Bergsteppe (Nr. 732). — 2 ♀♀, 1 ♂.

Verbreitung: Tibet.

#### 26. *Proformica coriacea* K.-UG.

Gobi Altaj aimak: Schargyn Gobi, SO-Ecke, 1130 m, 23. VI. 1966, sandiges, lehmiges, schotteriges Flachland, mit kleinen Sandhäufungen (Nr. 565); Zachuj Gobi, 10 km N vom Chatan chajrchan Gebirge, 1150 m, 27. VI. 1966, Oase in der Wüste (Nr. 591). — Chovd aimak: Chovd (Kobdo), ca. 5 km SW von der Stadt, 1500 m, 10. VII. 1966, von kahlen, felsigen Bergen umgebenes Tal mit sandigem Schotter (Nr. 666). — 1 ♀, 2 ♀♀.

Verbreitung: Mittelasien.

#### 27. *Proformica mongolica* EM.

Central aimak: Teregtin tal, östlicher Teil, 1350 m, 2. VII. 1963, dürre Caragana-Steppe (Nr. 73); 26 km von Somon Lun, 4. VII. 1964, Artemisia-Steppe (Nr. 262); Zuun-Chara, 850 m, 8. VII. 1964, an Feldern des Forschungsinstituts für Pflanzenschutz, von Kulturpflanzen und Unkraut (Nr. 281); Boro gol, 20 km O von Zuun-Chara, 1400 m, 9. VII. 1963, in sandigem Boden ein Wasserriß, üppige Vegetation, Caragana, Papaver, Vicia, Lilium, Allium etc.; Ulaan chodag, 16 km S von Somon Öndörschireet, 1500 m, 24. VII. 1966, Gebirgssteppe an einem nördlich exponierten Berghang (Nr. 739). — Chentej aimak: 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28. VII.–21. VIII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, an den Hängen mit Amygdalus-Gebüsch (Nr. 319 und 323); 15 km O von Somon Öndörchaan, 1 km S vom Fluß Kerulen, 1000 m, 30. VII. 1965, Artemisia-Steppe. — Čojbalsan aimak: 40 km O von Somon Tamzagbulag, 600 m, 11. VIII. 1965, Federgras-Steppe mit sehr viel Allium (Nr. 389); 160 km W vom See Bujr nur, Menengijn tal, 600 m, 15. VIII. 1965, Federgras-Steppe, viel Artemisia, Linaria etc. (Nr. 416); 50 km SO von Čojbalsan, 700 m, 15. VIII. 1965, hügelige Steppe, in den Tälern mit üppiger Vegetation, am Hügelrücken Federgras (Nr. 421); 15 km N von Somon Galuut, 850 m, 17. VIII. 1965, breites Tal mit blumenreicher Wiese (Nr. 433). — Suchebaator aimak: Chadatin-bulag, 60 km N von Somon Bajanterem, 950 m, 31. VII. 1965, abflußloser Talkessel mit großem Salzsee (Nr. 340); 44 km SSW von Baruun urt, 1050 m, 2.–3. VIII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, in einem tiefen Wasserriß mit Ulmus-Bäumen und Sorbus-Gebüsch, an den Abhängen mit Federgras, an den flachen Stellen mit Artemisia (Nr. 349); Ongon elis, 10 km S von Somon Chongor, 900 m, 3.–5. VIII. 1965,