

33. *Formica (Serviformica) clara* FOR.

Süd gobi aimak : 60 km W von Somon Bulgan, 1120 m, 20. VI. 1964, gewaltige Sandwüste mit großen Barchans, kahlen Sanddünen, mit viel Saxaul, Nitraria, Cynomorium (Nr. 161). — Gobi Altaj aimak : zwischen dem See Beger nuur und Somon Beger, 1400 m, 25.–26. VI. 1966, vom Sandboden (Nr. 579). — 20 ♀♀.

Verbreitung: Syrien und Mittelasien.

34. *Formica (Serviformica) uralensis* RUZS.

Central aimak : Borulčin tala, ca. 100 km SO von Ulan-Baator, 1400 m, 4. VII. 1963, breites Tal, ringsum hohe, felsige Berge, an den Berghängen verschiedenartiger Pflanzenwuchs (Nr. 90); Zuun-Chara, 1390 m, 8. VII. 1963, an den Kulturfeldern (Nr. 98); 130 km N von Ulan-Baator, 1400 m, 9. VII. 1963, an der Landstraße neben dem 130. Kilometerstein an einer sehr üppigen, mesophilen Wiese (Nr. 110); Songino, 24 km SW von Ulan-Baator, 1300 m, 13. VII. 1963, im Überschwemmungsgebiet des Flusses Tola im Galeriewald (Salix und Populus) (Nr. 113); Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500 m, 12. VI. 1964, Tal mit einem Bach, zweiseitig mit steiler Bergseite, an der nördlichen Seite Nadelwald, neben dem Bach mit Birkenbäumen, die Südseite ist eine trockene, steinige Steppe (Nr. 118); ca. 30 km O von Somon Nalajch, 1530 m, 14. VI. 1966, in der Nähe des Flusses Tola, am Wege nach Terelz, am feuchten Talgrund sowie an den trockeneren, kahlen Berghängen bis zum Waldrand (Nr. 532); Ulan chodag, 16 km S von Somon Öndörschireet, 1500 m, 24. VII. 1966, Gebirgssteppe an einem nördlich exponierten Berghang (Nr. 739). — Chentej aimak : zwischen Somon Zenchermandal und Somon Zargaltchaan, 10 km O von Zenchermandal, 1400 m, 27. VII. 1965, Bergsteppe mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 312); Čandagan Tal, 40 km O von Zargaltchaan, 1300 m, 28. VII. 1965, Federgras-Steppe (Nr. 316); 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28.–29. VII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, an den Hängen mit Amygdalus-Gebüsch (Nr. 319, 323); 15 km O von Öndörchaan, 1 km S vom Fluß Kerulen, 1000 m, 30. VII. 1965, Artemisia-Steppe (Nr. 327). — Čojbalsan aimak : 50 km SO von Čojbalsan, 700 m, 15. VIII. 1965, hügelige Steppe, in den Tälern mit üppiger Vegetation, am Hügelrücken Federgras (Nr. 421); 15 km N von Somon Galuut, 850 m, 17. VIII. 1965, breites Tal mit blumenreicher Wiese (Nr. 433). — Suchebaator aimak : 25 km N von Somon Bajanterem, 950 m, 1.–2. VIII. 1965, abflußloses, flaches Salzbecken (Nr. 344); 44 km SSW von Baruun urt, 1050 m, 2. VIII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, in einem tiefen Wasserriß mit Ulmus-Bäumen und Sorbus-Gebüsch, an den Abhängen mit Federgras, an den flachen Stellen mit Artemisia (Nr. 349); 5 km NO von Somon Dariganga, 1150 m, 8. VIII. 1965, ebene trockene Grassteppe (Nr. 374b); 15 km N von Somon Erdenezagan, 950 m, 8. VIII. 1965, sehr trockene Federgras-Steppe (Nr. 380). — Archangaj aimak : Changaj Gebirge, 8 km W von Somon Urdtamir, 1620 m, 19. VI. 1966, an der trockenen Bergsteppe und in einem Wasserriß (Nr. 538, 540); Changaj Gebirge, zwischen Somon Ichtamir und Somon Čuluut, ca. 20 km W von Somon Ichtamir, 3 km S vom Tal des Flusses Chanuj gol, 2150 m, 19. VI. 1966, typische Hochgebirgssteppe mit Nadelwäldern und im Tal mit sehr üppiger Vegetation, blühende Trollius-Wiesen usw. (Nr. 544, 547, 719); Changaj Gebirge, 8 km W von Somon Urdtamir, 1620 m, 21. VII. 1966, an der trockenen Bergsteppe und in einem Wasserriß (Nr. 724); Chaalgsim chundi bei Somon Tövschruulech, 63 km O von Somon Urdtamir, 1500 m, 22. VII. 1966, am Unkraut der Ackerfelder (Nr. 727). — Weit über 100 ♀♀, einige ♀♀ und ♂♂.

Verbreitung: Sibirien, Nordmongolei und Nordeuropa.